

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canishield 1,04 g ārstnieciskā kaklasiksna liela auguma suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena 65 cm kaklasiksna (26 g) satur:

Aktīvā viela: Deltametrīns 1,04 g

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs
Melnā ogle
Epoksidēta sojas pupiņu eļļa
Diizononila adipāts
Trifenilfosfāts
Polivinila hlorīds
Kalcija stearāts
Cinka stearāts
Stearīnskābe

Melna ārstnieciskā kaklasiksna, kas izdala baltu pulveri.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Suņi

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Veterinārās zāles nodrošina:

- blusu (*Ctenocephalides felis*) pastāvīgu nonāvēšanu 16 nedēļas;
- ērcu (*Ixodes ricinus*) pastāvīgu nonāvēšanu 6 mēnešus;
- smilšu mušu (*Phlebotomus perniciosus*) barošanās novēršanu un nonāvēšanu 5,5 mēnešus.

3.3. Kontrindikācijas

Nelietot kucēniem, kas jaunāki par 7 nedēļām.

Nelietot suņiem ar ādas bojājumiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot kaķiem. Deltametrīns ir kaitīgs kaķiem.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Tā kā kaklasiksna pilnīga iedarbība sākas pēc vienas nedēļas, to vēlams uzlikt 1 nedēļu pirms dzīvnieka iespējamās pakļaušanas invāzijai.

Ērces un smilšu mušas tiks nonāvētas un nokritīs no dzīvnieka ķermeņa attiecīgi 48 un 24 stundu laikā pēc kaklasiksnas iedarbības arī tad, ja tās nebūs sūkušas asinis. Nevar izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanos vai atsevišķu smilšu mušu kodienus. Šī iemesla dēļ nelabvēlīgos apstākļos nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm vai smilšu mušām saistītu infekcijas slimību pārnesšanas risku.

Lai nodrošinātu optimālu kontroli pret blusu invāziju mājssaimniecībās, kurās ir vairāki dzīvnieki, kaklasiksnas visiem šīs mājssaimniecības suņiem jāuzliek vienā laikā.

Blusas no dzīvniekiem bieži iemājo viņu grozos un vietās, kur dzīvnieki guļ un regulāri atpūšas, piemēram, paklājos un mīkstajās mēbelēs. Šīs vietas masveida invāzijas gadījumā un kontroles nolūkos ir regulāri jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Šampūna lietošanas ietekme uz efektivitātes ilgumu nav pētīta.

Neregulāra saskare ar ūdeni nesamazina kaklasiksnas efektivitāti.

Nevajadzīga pretparazītu līdzekļu lietošana vai lietošana, kas atšķiras no zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināt rezistences selektīvo spiedienu un samazināt efektivitāti. Lēmumam par šo veterināro zāļu lietošanu jābūt pamatotam ar apstiprinājumu par parazītu sugu un invāzijas slogu vai invāzijas risku, pamatojoties uz tā epidemioloģiskajām iezīmēm katram atsevišķam sunim.

Ir ziņots par rezistenci pret piretroīdiem un jo īpaši pret deltametrīnu blusām (*C. felis*) un ērcēm (*Rhipicephalus sanguineus*) suņiem. Lietojot šīs veterinārās zāles, ir jāņem vērā vietējā informācija par mērķa parazītu jutīgumu, ja tāda ir pieejama.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Ādas bojājumu gadījumā noņemt kaklasiksnu, līdz simptomi izzūd.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šo veterināro zāļu nejauša norīšana var izraisīt blakusparādības, tostarp neirotoksisku iedarbību. Uzglabāt kaklasiksnu paciņā līdz lietošanas uzsākšanai. Rīkojoties ar kaklasiksnu, nesmēķēt, neēst un nedzert. Neļaut maziem bērniem rotaļāties ar kaklasiksnu vai likt to mutē. Nekavējoties likvidēt jebkurus kaklasiksnas pārpalikumus vai atgriezumus. Pēc kaklasiksnas uzlikšanas mazgāt rokas ar aukstu ūdeni. Izvairīties no ilgstošas saskares ar kaklasiksnu vai suni, kam tā ir uzlikta. Suņiem, kuriem uzlikta kaklasiksna, neļaut gulēt vienā gultā ar saimniekiem, īpaši bērniem. Ja notikusi nejauša saskare ar muti vai norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Deltametrīns var izraisīt pastiprinātas jutības (alerģiskas) reakcijas jutīgiem cilvēkiem. Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret deltametrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm un ārstēto dzīvnieku. Pastiprinātas jutības reakciju gadījumā meklēt medicīnisku palīdzību.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Deltametrīns ir toksisks ūdenī dzīvojošiem organismiem. Suņi, kuriem uzlikta kaklasiksna, nedrīkst iekļūt ūdenstilpēs.

3.6. Blakusparādības

Suņi

Reti	Lokalizētas ādas reakcijas (nieze, eritēma, matu izkrišana) ¹
------	--

(1 līdz 10 dzīvniekiem/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):	
Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Izmainīta uzvedība (letarģija, hiperaktivitāte) ² , gremošanas trakta traucējumi (vemšana, diareja, pastiprināta siekalošanās), neiromuskulāri traucējumi (piemēram, ataksija, muskuļu trīce) ³

¹ skar kaklu vai ādu kopumā

² bieži saistīts ar ādas kairinājumu

³ simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā pēc kaklasiksnas noņemšanas

Ja rodas kāds no šiem simptomiem, kaklasiksna ir jānoņem un ieteicams sazināties ar veterinārārstu.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam, vai tā vietējam pārstāvim, vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt arī lietošanas instrukcijas apakšējā sadaļā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības laikā.

Grūsnība un laktācija:

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Laboratoriskajos pētījumos netika konstatēta teratogēna vai embriotoksiska iedarbība.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot kopā ar citiem ektoparazitīcīdiem (piretroīdiem, organofosfātiem).

3.9. Lietošanas veids un devas

Lietošanai uz ādas. Viena kaklasiksna vienam sunim, aplikšanai ap kaklu. Izņemt kaklasiksnu no aizsargiekpakojuma tieši pirms lietošanas. Pielāgot kaklasiksnu dzīvniekam ap kaklu tā, lai tā nebūtu ne pārāk brīva, ne arī pārāk stingra: izmēģiniet, vai starp kaklasiksnu un suņa kaklu var ievietot divus kopā saliktus pirkstus. Nogriezt lieko garumu, kas pārsniedz 5 cm. Regulāri pārbaudīt un noregulēt izmēru, piespiežot stiprinājuma augšpusē un pēc tam kaklasiksnu pielāgot nepieciešamajā garumā.



3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Ja suns ir apēdis kaklasiksnu (maz ticams gadījums), var parādīties šādi simptomi: nekoordinētas kustības, trīce, siekalošanās, vemšana, pakāļkāju stīvums. Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā. Lai iegūtu informāciju par simptomātisku ārstēšanu, ieteicams sazināties ar vietējo veterinārārstu.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojams.

3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATĶvet kods: QP53AC11

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Deltametrīns ir piretroīdu klases ektoparaziticīds.

Deltametrīns iedarbojas uz insektiem un ērcēm saskarsmes rezultātā. Darbības mehānisma pamatā ir nepārtraukta insekta nervu membrānu pieaugoša nātrija caurlaidība. Tā izraisa parazīta hiperaktivitāti, kam seko paralīze (šoka efekts), trīce un nāve.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Deltametrīns no kaklasiksnas lēni un nepārtraukti izdalās suņa apmatojumā. Aktīvā viela no tiešās saskares vietas izplatās pa visu ādas virsmu ar lipīdu palīdzību, kā arī apmatojumā. Dzīvnieks deltametrīnu neabsorbē sistēmiski.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav piemērojama.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 30 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: lietot nekavējoties.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt paciņu ārējā iepakojumā.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Primārā iepakojuma materiāls:

PET/PE/alumīnija/surlīna paciņa ar vienu kaklasiksnu.

Iepakojumu lielumi:

Kartona kastīte ar 1 vai 2 bērniem neatveramām paciņām.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo deltametrīns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Beaphar B.V.

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

V/DCP/18/0039

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 02/07/2018

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2023

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS
MARĶĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

KARTONA KASTĪTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canishield 1,04 g ārstnieciskā kaklasiksna

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Viena 65 cm kaklasiksna (26 g) satur:

Deltametrīns 1,04 g

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

1 kaklasiksna

2 kaklasiksna

4. MĒRKSUGAS

Liela auguma suņi

5. INDIKĀCIJAS

Veterinārās zāles nodrošina:

- blusu (*Ctenocephalides felis*) pastāvīgu nonāvēšanu 16 nedēļas;
- ērcu (*Ixodes ricinus*) pastāvīgu nonāvēšanu 6 mēnešus;
- smilšu mušu (*Phlebotomus perniciosus*) barošanās novēršanu un nonāvēšanu 5,5 mēnešus.

6. LIETOŠANAS VEIDI

Tikai lietošanai uz ādas.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt paciņu ārējā iepakojumā.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--



14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

V/DCP/18/0039

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

PACIŅA

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Canishield kaklasiksna



1 x 65 cm

beaphar

Logotips pēc izvēles

2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

Deltametrīns 1,04 g

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

Canishield 1,04 g ārstnieciskā kaklasiksna liela auguma suņiem

2. Sastāvs

Viena 65 cm kaklasiksna (26 g) satur:

Aktīvā viela: Deltametrīns 1,04 g

Viena melna ārstnieciskā kaklasiksna, kas izdala baltu pulveri.

3. Mērķsugas

Suņi

4. Lietošanas indikācijas

Veterinārās zāles nodrošina:

- blusu (*Ctenocephalides felis*) pastāvīgu nonāvēšanu 16 nedēļas;
- ērcu (*Ixodes ricinus*) pastāvīgu nonāvēšanu 6 mēnešus;
- smilšu mušu (*Phlebotomus perniciosus*) barošanās novēršanu un nonāvēšanu 5,5 mēnešus.

5. Kontrindikācijas

Nelietot kucēniem, kas jaunāki par 7 nedēļām.

Nelietot suņiem ar ādas bojājumiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot kaķiem. Deltametrīns ir kaitīgs kaķiem.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši brīdinājumi:

Tā kā kaklasiksna pilnīga iedarbība sākas pēc vienas nedēļas, to vēlams uzlikt 1 nedēļu pirms dzīvnieka iespējamās pakļaušanas invāzijai.

Ērces un smilšu mušas tiks nonāvētas un nokritīs no dzīvnieka ķermeņa attiecīgi 48 un 24 stundu laikā pēc kaklasiksna iedarbības arī tad, ja tās nebūs sūkušas asinis. Nevar izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanos vai atsevišķu smilšu mušu kodienus. Šī iemesla dēļ nelabvēlīgos apstākļos nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm vai smilšu mušām saistītu infekcijas slimību pārnesšanas risku.

Lai nodrošinātu optimālu kontroli pret blusu invāziju mājstāvētībā, kurās ir vairāki dzīvnieki, kaklasiksna visiem šīs mājstāvētības suņiem jāuzliek vienā laikā.

Blusas no dzīvniekiem bieži iemājo viņu grozos un vietās, kur dzīvnieki guļ un regulāri atpūšas, piemēram, paklājos un mīkstajās mēbelēs. Šīs vietas masveida invāzijas gadījumā un kontroles nolūkos ir regulāri jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Šampūna lietošanas ietekme uz efektivitātes ilgumu nav pētīta.

Neregulāra saskare ar ūdeni nesamazina kaklasiksna efektivitāti.

Nevajadzīga pretparazītu līdzekļu lietošana vai lietošana, kas atšķiras no zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināt rezistences selektīvo spiedienu un samazināt efektivitāti. Lēmumam par šo veterināro zāļu lietošanu jābūt pamatotam ar apstiprinājumu par parazītu sugu un invāzijas slogu vai invāzijas risku, pamatojoties uz tā epidemioloģiskajām iezīmēm katram atsevišķam sunim.

Ir ziņots par rezistenci pret piretroīdiem un jo īpaši pret deltametrīnu blusām (*C. felis*) un ērcēm (*Rhipicephalus sanguineus*) suņiem. Lietojot šīs veterinārās zāles, ir jāņem vērā vietējā informācija par mērķa parazītu jutīgumu, ja tāda ir pieejama.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Ādas bojājumu gadījumā noņemt kaklasiksnu, līdz simptomi izzūd.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šo veterināro zāļu nejauša norīšana var izraisīt blakusparādības, tostarp neirotoksisku iedarbību. Kaklasiksnu uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt kaklasiksnu paciņā līdz lietošanas uzsākšanai. Rīkojoties ar kaklasiksnu, nesmēķēt, neēst un nedzert. Neļaut maziem bērniem rotaļāties ar kaklasiksnu vai likt to mutē. Nekavējoties likvidēt jebkuras kaklasiksnas pārpalikumus vai atgriezumus. Pēc kaklasiksnas uzlikšanas mazgāt rokas ar aukstu ūdeni.

Izvairīties no ilgstošas saskares ar kaklasiksnu vai suni, kam tā ir uzlikta. Suņiem, kuriem uzlikta kaklasiksna, neļaut gulēt vienā gultā ar saimniekiem, īpaši bērniem.

Ja notikusi nejauša saskare ar muti vai norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Deltametrīns var izraisīt pastiprinātas jutības (alerģiskas) reakcijas jutīgiem cilvēkiem. Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret deltametrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm un ārstēto dzīvnieku. Pastiprinātas jutības reakciju gadījumā meklēt medicīnisku palīdzību.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Deltametrīns ir toksisks ūdenī dzīvojošiem organismiem. Suņi, kuriem uzlikta kaklasiksna, nedrīkst iekļūt ūdenstilpēs.

Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos netika konstatēta ietekme uz attīstību vai embriotoksiska ietekme.

Tomēr šo veterināro zāļu drošums grūšņiem suņiem nav noteikts.

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot kopā ar citiem ektoparazīticīdiem (piretroīdiem, organofosfātiem).

Pārdozēšana:

Maz ticamā gadījumā, ja suns apēd kaklasiksnu, var rasties šādi simptomi: nekoordinētas kustības, trīce, siekalošanās, vemšana, pakaļkāju stīvums. Šie simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā. Lai iegūtu papildinformāciju par simptomātisku ārstēšanu, ieteicams sazināties ar vietējo veterinārārstu.

Būtiska nesaderība:

Nav piemērojama.

7. Blakusparādības

Suņi

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):	Lokalizētas ādas reakcijas (nieze, eritēma, matu izkrišana) ¹
Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Izmainīta uzvedība (letarģija, hiperaktivitāte) ² , gremošanas trakta traucējumi (vemšana, diareja, pastiprināta siekalošanās), neiromuskulāri traucējumi (piemēram, ataksija, muskuļu trīce) ³

¹ skar kaklu vai ādu kopumā

² bieži saistīts ar ādas kairinājumu

³ simptomi parasti izzūd 48 stundu laikā pēc kaklasiksnas noņemšanas

Ja rodas kāds no šiem simptomiem, kaklasiksna ir jānoņem un ieteicams sazināties ar veterinārārstu.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē www.pvd.gov.lv.

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Tikai lietošanai uz ādas. Viena kaklasiksna vienam sunim, aplikšanai ap kaklu.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai



Izņemt kaklasiksnu no aizsargiekpakojuma tieši pirms lietošanas. Pielāgot kaklasiksnu dzīvniekam ap kaklu tā, lai tā nebūtu ne pārāk brīva, ne arī pārāk stingra: izmēģiniet, vai starp kaklasiksnu un suņa kaklu var ievietot divus kopā saliktus pirkstus. Nogriezt lieko garumu, kas pārsniedz 5 cm. Regulāri pārbaudīt un noregulēt izmēru, piespiežot stiprinājuma augšpusē un pēc tam kaklasiksnu pielāgot nepieciešamajam garumam.

10. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt paciņu ārējā iepakojumā.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: lietot nekavējoties.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes pēc EXP.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo deltametrīns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numurs(-i) un iepakojuma lielumi

V/DCP/18/0039

Iepakojuma lielumi:

Kartona kastīte ar 1 vai 2 bērniem neatveramām paciņām.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

01/2023

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Beaphar B.V

Oude Linderteseweg 9

8102 EV Raalte

Nīderlande

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Izplatītājs: SIA „BEAPHAR LATVIJA”

birojs Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067;

noliktava Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067,

t.22047870, LV018894

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar tirdzniecības atļaujas turētāja vietējo pārstāvi.

17. Cita informācija