

## PROSPECTO:

### GESTAVET-GnRH

Gonadorelina (acetato) 0,1 mg/ml, en solución inyectable.

#### 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

BIOGENESIS GLOBAL, S.L

Quintanadueñas, 6, Bloque A, 1º piso

28050 Madrid

España

Fabricante responsable de la liberación del lote:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

España

#### 2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

GESTAVET-GnRH

Gonadorelina (acetato) 0,1 mg/ml, en solución inyectable.

#### 3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Composición por ml:

**Sustancia activa:**

Gonadorelina (acetato)..... 0,1 mg

**Excipientes:**

Alcohol bencílico (E-1519)..... 10,5 mg

Otros excipientes, c.s.p

#### 4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Conejas: Inducción de la ovulación.

Vacas: Inducción y sincronización de la ovulación.

Reducción del periodo anovulatorio post-parto

Mejora de la fertilidad en el postparto.

Tratamiento de quistes ováricos.

#### 5. CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la gonadorelina.

#### 6. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

## 7. ESPECIES DE DESTINO

Conejas y vacas.

## 8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía intramuscular.

### Conejas:

Inducción de la ovulación: 0,2 ml de GESTAVET-GnRH (equivalente a 0,02 mg gonadorelina/animal).

### Vacas:

Para todas las indicaciones: 1 ml de GESTAVET-GnRH (equivalente a 0,1 mg gonadorelina/animal) en dosis única.

## 9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

En vacas lecheras, no administrar hasta 20-30 días post-parto, ya que no existe receptividad por parte del ovario.

En conejas no administrar a hembras menores de 86 días de edad.

Durante su administración debe utilizarse un equipo estéril, evitando la contaminación del producto.

## 10. TIEMPO DE ESPERA

**Conejas:** Carne: Cero días.

**Vacas:** Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C).

Conservar en el embalaje original.

## 12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

### **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales**

Este medicamento no debe ser administrado por mujeres gestantes.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente los ojos con agua abundante durante al menos 15 minutos.

Evitar el contacto con la piel. En caso de derrame del producto en la piel, lavar la zona inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos.

La autoinyección puede producir dolor e irritación local en la zona de inoculación.

En caso de autoinyección, contacto con los ojos o derrame sobre la piel accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

## **Uso durante la gestación y la lactancia**

### Gestación

Su uso no está recomendado durante la gestación.

### Lactancia

Puede utilizarse durante la lactancia

## **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

Ninguna conocida.

## **Sobredosificación**

No se han descrito efectos adversos.

## **Incompatibilidades**

No se han descrito.

## **13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

## **14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ**

08/2023

## **15. INFORMACIÓN ADICIONAL**

### Formatos:

- Caja con 1 vial de 5 ml, (en vial de 10 ml).
- Caja con 1 vial 10 ml, (en vial de 10 ml).
- Caja con 1 vial 20 ml, (en vial de 20 ml).
- Caja con 10 viales de 5 ml (en vial de 10 ml).
- Caja con 10 viales de 10 ml (en vial de 10 ml).
- Caja con 10 viales de 20 ml (en vial de 20 ml).

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

**Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

**Administración bajo control o supervisión del veterinario.**