

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühn, Pute und Kaninchen
Enrofloxacinum

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser.
Klare gelbliche Lösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

500 ml

1000 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hühn, Pute und Kaninchen.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Hühner: essbare Gewebe: 7 Tage

Puten: essbare Gewebe: 13 Tage

Kaninchen: essbare Gewebe: 3 Tage

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.
Nicht innerhalb von 2 Wochen vor Legebeginn anwenden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Fluorchinolone sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit Wasser spülen.

Nach der Anwendung Hände und Haut, die mit dem Präparat in Kontakt gekommen sind, waschen.

Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligen Anbrechen innerhalb von 12 Wochen aufbrauchen.

Nicht aufgebrauchte Reste des Präparates sind zu verworfen.

Mediziertes Wasser täglich frisch zubereiten. Nicht aufgebrauchte Reste des medikierten Wassers sind nach 24 Stunden zu verworfen.

Das Datum der ersten Entnahme ist auf dem Etikett einzutragen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V140314

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühn, Pute und Kaninchen
Enrofloxacinum

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml Baytril 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühn, Pute und Kaninchen
enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser.
Klare gelbliche Lösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
500 ml
1000 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hühn, Pute und Kaninchen.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Hühner: essbares Gewebe: 7 Tage
Puten: essbares Gewebe: 13 Tage
Kaninchen: essbares Gewebe: 3 Tage

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.
Nicht innerhalb von 2 Wochen vor Legebeginn anwenden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Fluorchinolone sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit Wasser spülen.

Nach der Anwendung Hände und Haut, die mit dem Präparat in Kontakt gekommen sind waschen.

Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen innerhalb von 12 Wochen aufbrauchen.

Nicht aufgebrauchte Reste des Präparates sind zu verwerfen.

Mediziertes Wasser täglich frisch zubereiten. Nicht aufgebrauchte Reste des medikierten Wassers sind nach 24 Stunden zu verwerfen.

Das Datum der ersten Entnahme ist auf dem Etikett einzutragen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V140314

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}