

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

500 Dosen, Flasche zu 150 ml
10 x 500 Dosen, 10 Flaschen zu je 150 ml
1000 Dosen, 1 Flasche zu 300 ml
10 x 1000 Dosen, 10 Flaschen zu je 300 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,3 ml Dosis enthält:

Inaktiviertes Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm Ulster 2C	$\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Inaktiviertes Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm Mass41	$\geq 18 \text{ HAH.E.}$
Inaktiviertes Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127	$\geq 180 \text{ HAH.E.}$
Inaktiviertes Puten Rhinotracheitis-Virus (Swollen Head Syndrom), Stamm VCO3	$\geq 0,76 \text{ ODD}$

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

0,3 ml/D
500 Dosen (150 ml)
10 x 500 Dosen (10 x 150 ml)
1000 Dosen (300 ml)
10 x 1000 Dosen (10 x 300 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Elterntiere und Junghennen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Anwendung.
Vor Gebrauch gut schütteln.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. PEI.V.01043.01.1

AT: Z. Nr. 8-20279

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**500 Dosen, 150 ml****1000 Dosen, 300 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis:

Inaktiviert:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm Ulster 2C | ≥ 50 PD ₅₀ |
| - Infektiöse Bronchitis-Virus, Stamm Mass41 | ≥ 18 HAH.E. |
| - Egg Drop Syndrom-Virus (EDS76), Stamm V127 | ≥ 180 HAH.E. |
| - Puten Rhinotracheitis-Virus (Swollen Head Syndrom),
Stamm VCO3 | ≥ 0.76 ODD |

0,3 ml/D

500 Dosen

1000 Dosen

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Elterntiere und Junghennen)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}