

**LIITE I**  
**VALMISTEYHTEENVETO**

## 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio, sioille

## 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

Yksi annos (2 ml) sisältää:

Kuiva-aine, kylmäkuivattu:

### **Vaikuttava aine:**

Eläviä, heikennettyjä kannan NIA<sub>3</sub>-783 Aujeszky taudin viruksia  $\geq 10^{5.2}$  CCID<sub>50</sub>\*

\*CCID<sub>50</sub> - viruksen määrä, joka elatusalustaan siirrettynä tartuttaa 50 % soluviljelmästä.

Liuotin:

### **Adjuvantit:**

alumiinihydroksidi	2,1 mg
mineraaliöljy (Marcol 52)	425 µl
mannidimono-oleaatti (Arlacel A)	46 µl
polysorbaatti 80 (Tween 80)	17µl

### **Apuaine:**

Tiomersaali	0,15 mg
-------------	---------

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

## 3. LÄÄKEMUOTO

Kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio.

Eläinlääkevalmisteen ulkonäkö ennen käyttökuntoon saattamista:

Liuotin: Valkoinen läpinäkymätön neste

Kylmäkuivattu kuiva-aine: Kermanvärinen kylmäkuivattu kuiva-aine

## 4. KLIINISET TIEDOT

### 4.1 Kohde-eläinlaji

Sika.

### 4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Sikojen aktiiviseen immunisointiin aikaisintaan 10 viikon iässä Aujeszky taudin aiheuttaman kuolleisuuden ja sen kliinisten oireiden ehkäisemiseksi sekä Aujeszky taudin luonnon kantaa olevan viruksen erityksen vähentämiseksi. Rokotettujen ensikoidan ja emakoiden synnyttämien porsaiden passiiviseen immunisointiin kuolleisuuden alentamiseksi ja Aujeszky taudin kliinisten oireiden vähentämiseksi sekä Aujeszky taudin luonnon kantaa olevan viruksen erityksen vähentämiseksi.

Immunitetin kehittyminen: 3 viikkoa perusrokotuksen jälkeen.

Immunitetin kesto: 3 kuukautta perusrokotuksen jälkeen.

### 4.3 Vasta-aiheet

Ei ole.

### 4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Rokota vain terveitä eläimiä.

Maternaalisten vasta-aineiden esiintyminen Aujeszky'n taudin virusta vastaan saattaa heikentää rokotteen tehoa.

### 4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

#### Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Rokotettujen ensikoiden ja emakoiden synnyttämien porsaiden on saatava riittävä määrä ternimaitoa ja maitoa.

#### Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Valmisteen käytön jälkeen on pestävä ja desinfioitava kädet ja käytetyt välineet.

#### Käyttäjälle:

Tämä eläinlääkevalmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta erityisesti, jos injektio osuu niveleen tai sormeen, ja voi harvinaisissa tapauksissa johtaa vahingoitetun sormen menetykseen, ellei nopeaa lääkinällistä hoitoa ole saatavilla.

Jos vahingossa injisoit itseesi tätä eläinlääkevalmistetta, sinun on viipymättä otettava yhteyttä lääkäriin, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä. Ota pakkausseloste mukaan lääkärintarkastukseen.

Jos kipu jatkuu yli 12 tuntia lääkärintarkastuksen jälkeen, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin.

#### Lääkärille:

Tämä eläinlääkevalmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä, voi aiheuttaa voimakasta turvotusta, joka voi johtaa esim. iskeemiseen nekroosiin ja jopa sormen menetykseen. Asiantuntijan tekemät PIKAiset kirurgiset toimenpiteet ovat tarpeellisia ja injektioalueen nopea aukaisu ja huuhtelu voivat olla välttämättömiä, erityisesti jos kysymyksessä on sormen pehmeä osa tai jänne.

### 4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)

Laboratorio- ja kenttätutkimuksissa jopa 50 %:lla sioista on ilmoitettu hyvin yleisenä haittavaikutuksena lieviä ja ohimeneviä paikallisia reaktioita, joiden läpimitta on enintään 2 cm ensimmäisen rokotuksen jälkeen ja 5 cm toisen rokotuksen jälkeen. Nämä reaktiot häviävät yleensä ensimmäistä rokotusta seuraavien 3 viikon aikana.

Laboratorio- ja kenttätutkimuksissa sioilla on ilmoitettu hyvin yleisenä haittavaikutuksena ruumin lämpötilan nousua rokotuksen jälkeen, enintään noin 40,5 °C:een. Lämpötilan nousu on ohimenevää ja kestää enintään 2 päivää.

Spontaaneissa ilmoituksissa on raportoitu yliherkkyysoireita hyvin harvoissa tapauksissa.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1 000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

#### 4.7 Käyttö tiineyden, imetyksen tai muninnan aikana

Voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

#### 4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoa.

Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti.

#### 4.9 Annostus ja antotapa

Lihakseen.

Ruiskuta 3 ml liuotinta injektiokuiva-ainetta sisältävään pieneen injektiopulloon rokotteen käyttökuntoon saattamista varten. Ravista varovasti, kunnes kuiva-aine liukenee, ja siirrä liuennut rokote liuotinta sisältävään injektiopulloon.

Vaahoamisen estämiseksi ravista pulloa varovasti kylmäkuivatun injektiokuiva-aineen ja liuottimen yhdistämisen jälkeen. Käytä vain steriilejä ruiskuja ja neuloja. Rokote injisoidaan sialle lihakseen yhtenä annoksena (2 ml) niskaan korvan takana olevalle alueelle.

##### Lihotussikojen ja siitossikojen perusrokotus (ensikot, emakot ja karjut):

- Yksi rokoteannos lihotussikaa kohti annetaan aikaisintaan 10 viikon iässä. Toinen annos voidaan antaa 3–4 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.
- Yksi rokoteannos siitossikaa kohti (ensikot, emakot ja karjut) annetaan aikaisintaan 10 viikon iässä. Sen jälkeen annetaan toinen annos 3–4 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

##### Siitossikojen (ensikot, emakot ja karjut) uudelleenrokotus:

- Ensikolle annetaan yksi rokoteannos ennen astuttamista tai
- Yksi annos ensikolle tai emakolle kunkin tiineyden aikana 3–6 viikkoa ennen odotettua porsimista.
- Karjulle annetaan yksi rokoteannos vähintään 6 kuukauden välein.

Sikalan kaikkien sikojen rokottamiseksi ensikoille, emakoille ja karjuille voidaan antaa yksi rokoteannos neljän kuukauden välein.

Eläinlääkevalmisteen ulkonäkö käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

Valkoinen läpinäkymätön neste.

#### 4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa)

Injektiokohdassa esiintyvien kudosreaktioiden lisääntymistä lukuunottamatta muita haittavaikutuksia ei ole todettu.

#### 4.11 Varoaika

Nolla vrk.

### 5. IMMUNOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunologiset valmisteet sioille, elävä virusrokote, Aujeszkyntauti -virus.

ATCvet-koodi: QI09AD01.

Vaikuttava aine saa aikaan sikojen aktiivisen immunitetin Aujeszkyntautia vastaan.

Yhdistämällä immunogeeni öljyemulsioon saadaan aikaan pidennetty immuniteetin stimulaatio. Rokotettujen ensikoiden ja emakoiden synnyttämät porsaatsaavat passiivisen immuniteetin ternimaidon ja maidon välityksellä.

Rokoteviruksen gE-ominaisuuden (glykoproteiini E negatiivinen) avulla tämän rokotteen indusoimat vasta-aineet voidaan erottaa Aujeszky-taudin luonnon kantaa olevan viruksen aiheuttamista vasta-aineista, jos rokotetta käytetään asianmukaisen diagnostisen testin kanssa. Rokotetta voidaan käyttää sioissa esiintyvän Aujeszky-taudin luonnon kantaa olevan viruksen hävitysohjelmassa, joka perustuu gE-vasta-aineiden esiintymiseen tai puuttumiseen.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

#### **Adjuvantit**

Alumiinihydroksidi  
Mineraaliöljy (Marcol 52)  
Mannidimono-oleaatti (Arlacel A)  
Polysorbaatti 80 (Tween 80)

#### **Apuaineet**

Tiomersaali  
Dinatriumvetyfosfaatti  
Natriumdivetyfosfaattidihydraatti  
Natriumkloridi  
Injektionesteisiin käytettävä vesi

### **6.2 Tärkeimmät yhteensopimattomuudet**

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

### **6.3 Kestoaika**

Avaamattoman pakkauksen kesto-aika: 2 vuotta.  
Ohjeiden mukaan käyttökuuntoon saatetun valmisteen kesto-aika: 1 tunti.

### **6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet**

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).  
Ei saa jäätyä.

### **6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus**

#### Kuiva-aine, kylmäkuivattu:

Hydrolyyttisestä luokan I lasista valmistettu injektio-pullo, joka sisältää 10, 50 tai 100 annosta kylmäkuivattua injektio-kuiva-ainetta. Injektio-pullot on suljettu butyylikumitulpalla ja sinetöity alumiinitulpalla.

#### Liuotin:

Luokan I hydrolyyttisestä lasista valmistetut injektio-pullot, joissa on liuotinta 20 ml, 100 ml tai 200 ml, tai luokan II lasista valmistetut injektio-pullot (huuhdeltu injektio-esteisiin käytettävällä vedellä) joissa on liuotinta 100 ml tai 200 ml. Injektio-pullot on suljettu butyylikumitulpalla ja sinetöity alumiinitulpalla.

Pahvikotelo, jossa on yksi injektio-pullo kuiva-ainetta (10 annosta) ja yksi 20 ml:n injektio-pullo liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on yksi injektiopullo kuiva-ainetta (50 annosta) ja yksi 100 ml:n injektiopullo liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on yksi injektiopullo kuiva-ainetta (100 annosta) ja yksi 200 ml:n injektiopullo liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on kymmenen injektiopulloa kuiva-ainetta (10 annosta) ja kymmenen 20 ml:n injektiopulloa liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on kymmenen injektiopulloa kuiva-ainetta (50 annosta) ja kymmenen 100 ml:n injektiopulloa liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on kymmenen injektiopulloa kuiva-ainetta (100 annosta) ja kymmenen 200 ml:n injektiopulloa liuotinta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

## **6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jättemateriaalien hävittämiselle**

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jättemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
BELGIA

## **8. MYYNTILUVAN NUMEROT**

EU/2/98/009/001-006

## **9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ /UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 07/08/1998.

Uudistamispäivämäärä: 22/08/2008.

## **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ema.europa.eu/>.

## **MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO**

Jokaisen henkilön, joka aikoo valmistaa, maahantuoda, pitää hallussaan, myydä, toimittaa tai käyttää tätä eläinlääkevalmistetta, on ensin otettava yhteyttä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen ajantasaisten rokotusmääräysten selvittämiseksi, koska edellä mainitut toimenpiteet saattavat olla kiellettyjä tässä jäsenvaltiossa tai jossakin sen osassa kansallisen lainsäädännön perusteella.

## **LIITE II**

- A. BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA**
- B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**
- C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ**

## **A. BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA**

### Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.  
Ctra. de Camprodón, s/nº  
Finca La Riba  
Vall de Bianya  
Gerona, 17813  
ESPANJA

### Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.  
Ctra. de Camprodón, s/nº  
Finca La Riba  
Vall de Bianya  
Gerona, 17813  
ESPANJA

## **B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**

Eläinlääkemääräys.

Euroopan parlamentin ja neuvoston muuttetun direktiivin 2001/82/EY 71 artiklan mukaisesti jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kieltää immunologisen eläinlääkevalmisteen maahantuonnin, myynnin, jakelun ja/tai käytön koko alueellaan tai osassa sitä, jos osoitetaan, että:

- a) valmisteen käyttäminen on ristiriidassa kansallisen ohjelman kanssa, joka koskee eläintautien diagnosointia, valvontaa tai hävittämistä, tai valmisteen käyttö vaikeuttaa sen varmistamista, että kontaminaatiota ei esiinny elävissä eläimissä tai rokotetuista eläimistä peräisin olevissa elintarvikkeissa tai muissa tuotteissa.
- b) tautia, jota vastaan valmisteen on tarkoitus antaa immuniteetti, ei esiinny suuressa määrin kyseisellä alueella.

## **C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ**

Asetusta (EY) No 470/2009 ei sovelleta biologista alkuperää oleviin vaikuttaviin aineisiin, joilla on tarkoitus saada aikaan aktiivinen immuniteetti.

Valmisteyhteenvedon kappaleessa 6.1. luetellut apuaineet (mukaan lukien adjuvantit) ovat joko sallittuja aineita, joille Komission asetuksen 37/2010 liitteen taulukon 1 mukaisesti ei tarvita jäämien enimmäismäärää tai lueteltujen apuaineiden (mukaan lukien adjuvanttien) ei katsota kuuluvan Asetuksen (EU) No 470/2009 soveltamisalaan kun niitä käytetään kuten tässä eläinlääkevalmistuksessa.



**LIITE III**

**MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE**

## **A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT**

**SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA**

**PAHVIKOTELO**

**(1 X 10 ANNOSTA, 1 X 50 ANNOSTA, 1 X 100 ANNOSTA, 10 X 10 ANNOSTA,  
10 X 50 ANNOSTA JA 10 X 100 ANNOSTA)**

**1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI**

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio, sioille

**2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)**

Yksi annos (2 ml) sisältää:

Eläviä, heikennettyjä kannan NIA<sub>3</sub>-783 Aujeszkyyn taudin viruksia  $\geq 10^{5.2}$  CCID<sub>50</sub>

**3. LÄÄKEMUOTO**

Kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio

**4. PAKKAUSKOKO**

1 x 10 annosta (20 ml)

1 x 50 annosta (100 ml)

1 x 100 annosta (200 ml)

10 x 10 annosta (20 ml)

10 x 50 annosta (100 ml)

10 x 100 annosta (200 ml)

**5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)**

Sika



**6. KÄYTTÖAIHEET**

**7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)**

Lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

**8. VAROAIKA (VAROAJAT)**

Varoaika: Nolla vrk.

## **9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)**

Vahinkoinjektio on vaarallinen.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

## **10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {kuukausi/vuosi}  
Käytä käyttökuntoon saatettu valmiste 1 tunnin kuluessa.

## **11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Säilytä ja kuljeta kylmänä.  
Ei saa jäätyä.

## **12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI**

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

## **13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN**

Eläimille.  
Reseptivalmiste.

Tämän eläinlääkevalmisteen maahantuonti, hallussapito, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö voi olla kielletty jäsenvaltiossa tai sen osassa. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

## **14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”**

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

## **15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
BELGIA

## **16. MYYNTILUPIEN NUMEROT**

EU/2/98/009/001 (1 x 20 ml)  
EU/2/98/009/002 (1 x 100 ml)  
EU/2/98/009/003 (1 x 200 ml)  
EU/2/98/009/004 (10 x 20 ml)

EU/2/98/009/005 (10 x 100 ml)

EU/2/98/009/006 (10 x 200 ml)

**17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO**

Lot: {numero}

**PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT:**

**LASI-INJEKTIOPULLO, KYLMÄKUIVATTU KUIVA-AINE (10, 50 TAI 100 ANNOSTA)**

**1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W kuiva-aine, kylmäkuivattu injektionestettä varten, emulsio, sioille



**2. VAIKUTTAVAN AINEEN MÄÄRÄT**

Elävä, heikennetty Aujeszky taudin virus  $\geq 10^{5.2}$  CCID<sub>50</sub>

**3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ**

10 annosta

50 annosta

100 annosta

**4. ANTOREITIT**

i.m.

**5. VAROAIKA (VAROAJAT)**

Varoaika: Nolla vrk.

**6. ERÄNUMERO**

Lot {numero}

**7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {kuukausi/vuosi}

Käytä käyttökuntoon saatettu valmiste 1 tunnin kuluessa.

**8. MERKINTÄ "ELÄIMILLE"**

Eläimille.

**SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT**

**LASI-INJEKTIOPULLO, LIUOTIN (100 TAI 200 ML)**

**1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Suvaxy Aujeszky 783 + O/W liuotin injektionestettä varten, emulsio, sioille

**2. VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT**

**3. LÄÄKEMUOTO**

Liuotin injektionestettä varten, emulsio

**4. PAKKAUSKOKO**

100 ml  
200 ml

**5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)**

Sika



**6. KÄYTTÖAIHEET**

**7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)**

i.m.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

**8. VAROAIKA (VAROAJAT)**

Varoaika: Nolla vrk.

**9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)**

Vahinkoinjektio on vaarallinen.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

**10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {kuukausi/vuosi}

Käytä käyttökuntoon saatettu valmiste 1 tunnin kuluessa.

**11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Säilytä ja kuljeta kylmänä.

Ei saa jäätyä.

**12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI**

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

**13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN**

Eläimille.

Reseptivalmiste.

**14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”**

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

**15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
BELGIA

**16. MYYNTILUPIEN NUMEROT**

EU/2/98/009/002 (1 x 100 ml)  
EU/2/98/009/003 (1 x 200 ml)  
EU/2/98/009/005 (10 x 100 ml)  
EU/2/98/009/006 (10 x 200 ml)

**17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO**

Lot: {numero}



**PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT:**

**LASI-INJEKTIOPULLO, LIUOTIN (20 ML)**

**1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W liuotin injektionestettä varten, emulsio, **sioille**



**2. VAIKUTTAVAN AINEEN MÄÄRÄT**

**3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ**

20 ml

**4. ANTOREITIT**

i.m.

**5. VAROAIKA (VAROAJAT)**

Varoaika: Nolla vrk.

**6. ERÄNUMERO**

Lot {numero}

**7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {kuukausi/vuosi}

Käytä käyttökuntoon saatettu valmiste 1 tunnin kuluessa.

**8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”**

Eläimille.

## **B. PAKKAUSSELOSTE**

## PAKKAUSSELOSTE

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, emulsiota varten, sioille

### **1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI**

Myyntiluvan haltija:

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
BELGIA

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.  
Ctra. de Camprodón, s/nº  
Finca La Riba  
Vall de Bianya  
Gerona, 17813  
ESPANJA

### **2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, emulsiota varten, sioille

### **3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET**

Yksi annos (2 ml) sisältää:

Kylmäkuivattu kuiva-aine:

**Vaikuttava aine:**

Eläviä, heikennettyjä kannan NIA<sub>3</sub>-783 Aujeszky taudin viruksia  $\geq 10^{5.2}$  CCID<sub>50</sub>\*

\*CCID<sub>50</sub> - viruksen määrä, joka elatusalustaan siirrettynä tartuttaa 50 % soluviljelmästä.

Liuotin:

Alumiinihydroksidi, mineraaliöljy (Marcol 52), mannidimono-oleaatti (Arlacel A), polysorbaatti 80 (Tween 80), tiomersaali

Eläinlääkevalmisteen ulkonäkö ennen käyttökuntoon saattamista:

Liuotin: Valkoinen läpinäkymätön neste

Kylmäkuivattu kuiva-aine: Kermanvärinen kylmäkuivattu kuiva-aine

### **4. KÄYTTÖAIHEET**

Sikojen aktiiviseen immunisointiin aikaisintaan 10 viikon iässä Aujeszky taudin aiheuttaman kuolleisuuden ja sen kliinisten oireiden ehkäisemiseksi sekä Aujeszky taudin luonnon kantaa olevan viruksen erityksen vähentämiseksi. Rokotettujen ensikoiden ja emakoiden jälkeläisten passiiviseen immunisointiin kuolleisuuden alentamiseksi ja Aujeszky taudin kliinisten oireiden vähentämiseksi sekä Aujeszky taudin luonnon kantaa olevan viruksen erityksen vähentämiseksi.

Immunitetin kehittyminen: 3 viikkoa perusrokotuksen jälkeen.  
Immunitetin kesto: 3 kuukautta perusrokotuksen jälkeen.

## 5. VASTA-AIHEET

Ei ole.

## 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Laboratorio- ja kenttätutkimuksissa jopa 50 %:lla sioista on ilmoitettu hyvin yleisenä haittavaikutuksena lieviä ja ohimeneviä paikallisia reaktioita, joiden läpimitta on enintään 2 cm ensimmäisen rokotuksen jälkeen ja 5 cm toisen rokotuksen jälkeen. Nämä reaktiot häviävät yleensä ensimmäistä rokotusta seuraavien 3 viikon aikana.

Laboratorio- ja kenttätutkimuksissa sioilla on ilmoitettu hyvin yleisenä haittavaikutuksena ruumin lämpötilan nousua rokotuksen jälkeen, enintään noin 40,5 °C:een. Lämpötilan nousu on ohimenevää, ja kestää enintään 2 päivää.

Spontaaneissa ilmoituksissa on raportoitu yliherkkyysoireita hyvin harvoissa tapauksissa.

Haittavaikutusten esiintyvyyttä määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1 000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## 7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Sika.



## 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Lihakseen.

Yksi annos (2 ml) käyttökuuntoon saatettua emulsiota.

### Rokotusohjelma:

Lihotussikojen ja siitossikojen perusrokotus (ensikot, emakot ja karjut):

- Yksi rokoteannos lihotussikaa kohti annetaan aikaisintaan 10 viikon iässä. Toinen annos voidaan antaa 3-4 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.
- Yksi rokoteannos siitossikaa kohti (ensikot, emakot ja karjut) annetaan aikaisintaan 10 viikon iässä. Sen jälkeen annetaan toinen annos 3-4 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Siitossikojen (ensikot, emakot ja karjut) uudelleenrokotus:

- Ensikolle annetaan yksi rokoteannos ennen astuttamista tai

- Yksi annos ensikolle tai emakolle kunkin tiineyden aikana 3-6 viikkoa ennen odotettua porsimista.
- Karjulle annetaan yksi rokoteannos vähintään 6 kuukauden välein.

Sikalan kaikkien sikojen rokottamiseksi ensikoille, emakoille ja karjuille voidaan antaa yksi rokoteannos neljän kuukauden välein.

## **9. ANNOSTUSOHJEET**

Ruiskuta 3 ml liuotinta injektiokuiva-ainetta sisältävään pieneen injektiopulloon rokotteen käyttökuntoon saattamista varten. Ravista varovasti, kunnes kuiva-aine liukenee, ja siirrä liuennut rokote liuotinta sisältävään injektiopulloon. Vaahtoamisen estämiseksi ravista pulloa varovasti kylmäkuivatun injektiokuiva-aineen ja liuottimen yhdistämisen jälkeen. Käytä vain steriilejä ruiskuja ja neuloja. Rokote injisoidaan sialle lihakseen yhtenä annoksena (2 ml) niskaan korvan takana olevalle alueelle.

Eläinlääkevalmisteen ulkonäkö käyttökuntoon saattamisen jälkeen:  
Valkoinen läpinäkymätön neste.

## **10. VAROAIKA (VAROAJAT)**

Nolla vrk.

## **11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).  
Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä ja kotelossa.

Ohjeiden mukaan käyttökuntoon saatetun valmisteen kesto aika: 1 tunti.

## **12. ERITYISVAROITUKSET**

Jokaisen henkilön, joka aikoo valmistaa, maahantuoda, pitää hallussaan, myydä, toimittaa tai käyttää tätä eläinlääkevalmistetta, on ensin otettava yhteyttä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen ajantasaisten rokotusmääräysten selvittämiseksi, koska edellä mainitut toimenpiteet saattavat olla kiellettyjä tässä jäsenvaltiossa tai jossakin sen osassa kansallisen lainsäädännön perusteella.

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Rokota vain terveitä eläimiä.

Maternaalisten vasta-aineiden esiintyminen Aujeszkyin taudin virusta vastaan saattaa heikentää rokotteen tehoa.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Rokotettujen ensikoiden ja emakoiden synnyttämien porsaiden on saatava riittävä määrä ternimaitoa ja maitoa.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Valmisteen käytön jälkeen on pestävä ja desinfioitava kädet ja käytetyt välineet.

#### Käyttäjälle:

Tämä eläinlääkevalmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta erityisesti, jos injektio osuu niveleen tai sormeen, ja voi harvinaisissa tapauksissa johtaa vahingoitetun sormen menetykseen, ellei nopeaa lääkinnällistä hoitoa ole saatavilla.

Jos vahingossa injisoit itseesi tätä eläinlääkevalmistetta, sinun on viipymättä otettava yhteyttä lääkäriin, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä. Ota pakkausseloste mukaan lääkärintarkastukseen. Jos kipu jatkuu yli 12 tuntia lääkärintarkastuksen jälkeen, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin.

#### Lääkärille:

Tämä eläinlääkevalmiste sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektio, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä, voi aiheuttaa voimakasta turvotusta, joka voi johtaa esim. iskeemiseen nekroosiin ja jopa sormen menetykseen. Asiantuntijan tekemät PIKAISET kirurgiset toimenpiteet ovat tarpeellisia ja injektioalueen nopea aukaisu ja huuhtelu voivat olla välttämättömiä, erityisesti jos kysymyksessä on sormen pehmeä osa tai jänne.

#### Tiineys ja imetys:

Voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

#### Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti.

#### Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Injektiokohdassa esiintyvien kudoksetiläisten lisäntymistä lukuun ottamatta muita haittavaikutuksia ei ole todettu.

#### Yhteensopimattomuudet:

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

### **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI**

Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

### **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa: <http://www.ema.europa.eu/>.

### **15. MUUT TIEDOT**

Vaikuttava aine saa aikaan sikojen aktiivisen immunitetin Aujeszkyntautia vastaan.

Yhdistämällä immunogeeni öljyemulsioon saadaan aikaan pidennetty immunitetin stimulaatio.

Rokotettujen ensikoiden ja emakoiden jälkeläiset saavat passiivisen immunitetin ternimaidon ja maidon välityksellä.

Rokoteviruksen gE-ominaisuuden (glykoproteiini E negatiivinen) avulla tämän rokotteen indusoimat vasta-aineet voidaan erottaa Aujeszkyntaudin luonnon kantaa olevan viruksen aiheuttamista vasta-

aineista, jos rokotetta käytetään asianmukaisen diagnostisen testin kanssa. Rokotetta voidaan käyttää sioissa esiintyvän Aujeszky-taudin luonnon kantaa olevan viruksen hävitysohjelmassa, joka perustuu gE-vasta-aineiden esiintymiseen tai puuttumiseen.

Pahvikotelo, jossa on yksi injektio-pullo kuiva-ainetta (10 annosta) ja yksi 20 ml:n injektio-pullo liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on yksi injektio-pullo kuiva-ainetta (50 annosta) ja yksi 100 ml:n injektio-pullo liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on yksi injektio-pullo kuiva-ainetta (100 annosta) ja yksi 200 ml:n injektio-pullo liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on kymmenen injektio-pulloa kuiva-ainetta (10 annosta) ja kymmenen 20 ml:n injektio-pulloa liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on kymmenen injektio-pulloa kuiva-ainetta (50 annosta) ja kymmenen 100 ml:n injektio-pulloa liuotinta.

Pahvikotelo, jossa on kymmenen injektio-pulloa kuiva-ainetta (100 annosta) ja kymmenen 200 ml:n injektio-pulloa liuotinta.

Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole markkinoilla.