

MARKĒJUMS
V/MRP/07/1684

INFORMĀCIJAI, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

50 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ecomectin 10 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām
Ivermectin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:
Aktīvā viela: ivermektīns 10 mg
Palīgviela: benzilspirts 10 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
200 ml
250 ml
500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Pretparazītu zāles liellopiem, aitām un cūkām.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Injicēt subkutāni šādās devās:
Liellopiem 1,0 ml uz 50 kg
Aitām 0,5 ml uz 25 kg
Cūkām 1,5 ml uz 50 kg
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:
Gaļai un blakusproduktiem: 49 dienas.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 42 dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas

Nelietot laktējošām piena govīm un aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. Nelietot nelaktējošām piena govīm, tostarp grūsnām piena telēm, vai nelaktējošām piena aitām 60 dienas pirms dzemdībām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 28 dienas laikā.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt tiešo iepakojumu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

ĪPAŠI BĪSTAMS ZIVĪM UN ŪDENS VIDEI. Nepiesārņojiet ar šīm veterinārajām zālēm vai izlietoto iepakojumu virszemes ūdeņus vai novadgrāvjus. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM“ UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ“.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ECO Animal Health Europe Limited
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, D04 TR29
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/07/1684

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

MARKĒJUMS
V/MRP/07/1684

INFORMĀCIJAI, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

50 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ecomectin 10 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām
Ivermectin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:
Aktīvā viela: ivermektīns 10 mg
Palīgviela: benzilspirts 10 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
200 ml
250 ml
500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas.

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Gremošanas trakta nematožu, plaušu tārpu, acu tārpu, spindeļu, kašķa ērcu un utu izraisīto slimību ārstēšanai gaļas liellopiem un nelaktējošām piena govīm.

Aitām:

Psoroptozes (aitu kašķa), gremošanas trakta nematožu, plaušu tārpu un aitu spindeļu invāzijas ārstēšanai.

Cūkām:

Gremošanas trakta nematožu, plaušu tārpu, utu un kašķa ērcu invāzijas ārstēšanai cūkām.

Ieteicamā deva: 200 mikrogrami ivermektīna uz kg ķermeņa svara liellopiem un aitām, un 300 mikrogrami ivermektīna uz kg ķermeņa svara cūkām.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS

Ārstēšanai:

Injicēt subkutāni šādās devās:

Liellopiem 1,0 ml uz 50 kg

Aitām 0,5 ml uz 25 kg

Cūkām 1,5 ml uz 50 kg

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 49 dienas.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 42 dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai subkutānām injekcijām.

Nelietot laktējošām piena govīm un aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. Nelietot nelaktējošām piena govīm, tostarp grūsnām piena telēm, vai nelaktējošām piena aitām 60 dienas pirms dzemdībām.

Ne mērķa sugu dzīvniekiem var būt slikta avermektīnu panesība. Suņiem ir novēroti zāļu nepanesības gadījumi ar letālu iznākumu – īpaši kollijiem, angļu aitū suņiem un līdzīgām šķirnēm un to krustojumiem, kā arī sauszemes/ūdens bruņurupučiem.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 28 dienas laikā.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt tiešo iepakojumu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

ĪPAŠI BĪSTAMS ZIVĪM UN ŪDENS VIDEI. Nepiesārņojiet ar šīm veterinārajām zālēm vai izlietoto iepakojumu virszemes ūdeņus vai novadgrāvjus. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM“ UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ“.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ECO Animal Health Europe Limited
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, D04 TR29
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/07/1684

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot: