

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos voor 50, 100 en 250 ml injectieflacons****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor 300 mg/ml
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml:
florfenicolum 300 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml
100 ml
250 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund en schaap / Bovins et moutons / Rind und Schaf

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)****Behandeling / Traitement / Behandlung:**

Rund / Bovins / Rind: i.m./s.c.

Schaap / Moutons / Schaf: i.m.

Metafylaxis / Métaphylaxie / Metaphylaxe:

Rund/ Bovins / Rind: s.c.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd / Temps d'attente / Wartezeit:

Vlees en slachtafval / Viande et abats / Essbare Gewebe:

Rund / Bovins / Rind:

i.m. (2 x 20 mg/kg LG / PC / KG): 30 d. / j. / T.

s.c. (1 x 40 mg/kg LG / PC / KG): 44 d. / j. / T.

Schaap / Moutons / Schaf: 39 d. / j. / T.

Melk / Lait / Milch:

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren, inclusief drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, y compris les animaux gestants producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, inklusive trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking / Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire / Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der

Primärverpackung: 28 d. / j. / T.

Na openen gebruiken voor / Après ouverture à utiliser avant / Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: ...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de koelkast bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas conserver au réfrigérateur. À conserver à l'abri du gel.

Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern. Vor Frost schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. / À usage vétérinaire uniquement. / Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. / Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. / Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V170825

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket op injectieflacon van 100 en 250 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor 300 mg/ml
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml:
florfenicum 300 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund en schaap / Bovins et moutons / Rind und Schaf

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Behandeling / Traitement / Behandlung: i.m./s.c.
Metafylaxis / Métaphylaxie / Metaphylaxe: s.c.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd / Temps d'attente / Wartezeit:

Vlees en slachtafval / Viande et abats / Essbare Gewebe:

Rund / Bovins / Rind:

i.m. (2x 20 mg/kg LG / PC / KG): 30 d. / j. / T.

s.c. (1x 40 mg/kg LG / PC / KG): 44 d. / j. / T.

Schaap / Moutons / Schaf: 39 d. / j. / T.

Melk / Lait / Milch:

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren, inclusief drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, y compris les animaux gestants producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, inklusive trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking / Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire / Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung: 28 d. / j. / T.

Na openen gebruiken voor / Après ouverture à utiliser avant / Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: ...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de koelkast bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas conserver au réfrigérateur. À conserver à l'abri du gel.

Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern. Vor Frost schützen.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket op injectieflacon à 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Florfenicolum 300 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking / Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire / Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung: 28 d. / j. / T.

Na openen gebruiken voor / Après ouverture à utiliser avant/ Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: ...