

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Peptizole 370 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs grams satur:

Aktīvā viela:

Omeprazols: 370 mg

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)	2 mg
Etanolamīns	
Kanēļa lapu eļļa	
Vazelīneļļa	

Eļļaina, dzeltena līdz dzeltenbrūna pasta.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Zirgi.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Kuņģa čūlu ārstēšanai un novēršanai zirgiem.

3.3. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Nav ieteicams dzīvniekiem, kas jaunāki par 4 nedēļām vai sver mazāk par 70 kg.

Veterinārārstam jāapsver atbilstošu diagnostikas pārbaūžu veikšanas nepieciešamība pirms terapeitiskās devas lieluma izvēles.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Stress (ieskaitot augstas intensitātes treniņus un sacensības), barošana, zirgaudzēšanas un zirgkopības prakse var būt saistīta ar kuņģa čūlu veidošanos zirgiem. Personām, kuras ir atbildīgas par zirgu labsajūtu un stāvokli, ir jāapsver čūlu rašanos veicinošo faktoru samazināšana, veicot izmaiņas zirgkopības praksē, lai panāktu uzlabošanos vienā vai vairākās turpmāk minētajās jomās: stresa pazemināšana, badošanās samazināšana, palielināts rupjas barības uzņemšanas apjoms un ganību pieejamība.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Tā kā šīs veterinārās zāles var izraisīt kairinājuma un pastiprinātas jutības reakcijas, nepieļaut saskari ar ādu un acīm. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm un tās ievadot, lietot necaurīdīgus cimdus, neēst un nedzert. Pēc lietošanas nomazgāt rokas un ādu, kas bijusi saskarē ar veterinārajām zālēm. Ja notikusi nokļūšana acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojums marķējumu ārstam. Personām, kurām pēc saskares ar šīm veterinārajām zālēm radušās reakcijas, meklēt medicīnisko palīdzību un turpmāk izvairīties no darbībām ar šīm veterinārajām zālēm.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

3.6. Blakusparādības

Nav zināmas.

Pastiprinātas jutības reakcijas gadījumā ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim, vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontakthinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos žurkām un trušiņiem netika konstatēta teratogēna iedarbība.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā. Šo veterināro zāļu lietošana ķēvēm grūsnības vai laktācijas laikā nav ieteicama.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Omeprazols var kavēt varfarīna elimināciju. Cita mijiedarbība ar zālēm, ko parasti lieto zirgu ārstēšanai, nav gaidāma, lai gan nevar izslēgt mijiedarbību ar zālēm, kuras metabolizē aknu enzīmi.

3.9. Lietošanas veids un devas

Iekšķīgai lietošanai.

Omeprazols ir efektīvs dažādu šķirņu zirgu ārstēšanai un dažādos zirgaudzēšanas apstākļos, kā arī kumeliem jau no četrpadsmit nedēļu vecuma, ja to svars pārsniedz 70 kg un vaislas ērzeļiem.

Kuņģa čūlu ārstēšanai: vienu reizi dienā 28 dienas pēc kārtas devā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara (1 perorālas šļirces iedaļa/50 kg ķ.sv.); pēc tam turpmākās 28 dienas, lai mazinātu kuņģa čūlu atkārtotas rašanās iespēju ārstēšanas laikā - vienu reizi dienā ievadīt 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Ja atkārtoti radušās čūlas, ir ieteicams veikt ārstēšanu vēlreiz, lietojot omeprazolu devā 4 mg uz kg ķermeņa svara (1 perorālas šļirces iedaļa/50 kg ķ.sv.).

Ir ieteicams ārstēšanu saskaņot ar izmaiņām zirgkopības un treniņu praksē. Lūdzu skatīt arī informāciju 3.5. apakšpunktā.

Kuņģa čūlu novēršanai: vienu reizi dienā devā 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 4 mg/kg, iestatiet perorālās šļirces virzuli uz zirga svaram atbilstošās devas iedaļas. Katra perorālās šļirces iedaļa uz virzuļa nodrošina 50 kg ķermeņa svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas ievadīšanu. Vienas perorālās šļirces saturs ir paredzēts 700 kg smaga zirga ārstēšanai devu režīmā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 1 mg/kg, iestatiet perorālās šļirces virzuli uz devas iedaļas, kas atbilst vienai ceturtajai daļai zirga ķermeņa svara. Piemēram, lai ārstētu zirgu, kura svars ir 400 kg, iestatiet virzuli uz 100 kg. Šajā devu režīmā katra perorālās šļirces iedaļa nodrošina 200 kg ķermeņa svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas ievadīšanu.

Pēc lietošanas uzlieciet uzgali.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Pieaugušiem zirgiem un kumelēm, kas vecāki par 2 mēnešiem, netika novērotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola 91 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā līdz pat 20 mg/kg.

Vaislas ērzeļiem netika novērotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības (it īpaši attiecībā uz spermas kvalitāti un reprodūktīvo uzvedību) pēc omeprazola 71 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā 12 mg/kg.

Pieaugušiem zirgiem netika novērotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola 21 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā 40 mg/kg.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu izmanto cilvēku uzturā.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATĶvet kods: QA02BC01

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Līdz pat 28 dienām ilgos pētījumos tika konstatēts, ka ārstēšana ar omeprazolu devu režīmā 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara palīdz novērst atkārtotu kuņģa čūlu veidošanos zirgiem, kuri pakļauti čūlu rašanos veicinošiem apstākļiem.

Omeprazols ir protonu sūkņa inhibitors, kas pieder aizvietoto benzimidazola savienojumu grupai. Tas ir antacīds peptisku čūlu ārstēšanai.

Omeprazols nomāc kuņģa skābes sekrēciju, specifiski inhibējot H^+/K^+-ATF -āzes enzīmu sistēmu uz parietālo šūnu sekrēcijas virsmas. H^+/K^+-ATF -āzes enzīmu sistēma ir skābes (protonu) sūknis kuņģa gļotādā. Tā kā H^+/K^+-ATF -āzes enzīmu sistēma ir pēdējais ar skābes sekrēciju saistītais posms, omeprazols bloķē sekrēciju neatkarīgi no stimulācijas. Omeprazols neatgriezeniski piesaistās kuņģa parietālo šūnu H^+/K^+-ATF -āzes enzīmam, kas sūknē ūdeņraža jonus kuņģa lūmenā, apmainot ar kālija joniem.

8, 16 un 24 stundas pēc iekšķīgas 4 mg/kg/dienā omeprazola devas ievades zirgiem pentagastrīna stimulētās kuņģa skābes sekrēcijas inhibīcijas apjoms bija 99 %, 95 % un 90 %, bet bazālā sekrēcija tika inhibēta 99 %, 90 % un 83 % apmērā.

Pilnīga inhibējoša iedarbība uz skābes sekrēciju tiek sasniegta piecas dienas pēc pirmās ievadīšanas reizes.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Vidējā omeprazola biopieejamība pēc iekšķīgas lietošanas pastas veidā ir 10,5 % (4,1 līdz 12,7 % robežās). Absorbēšana ir ātra, laiks līdz maksimālās koncentrācijas sasniegšanai plazmā (T_{max}) ir apmēram 1,25 stundas pēc devas ievadīšanas. Vidējās maksimālās koncentrācijas (C_{max}) vērtības atsevišķiem dzīvniekiem ir robežās no 121 ng/ml līdz 1470 ng/ml pēc 4 mg/kg devas ievadīšanas. Pēc iekšķīgas lietošanas ir novērojams ievērojams presistēmiskas metabolizācijas efekts. Omeprazols tiek ātri metabolizēts galvenokārt demetilēta un hidroksilēta omeprazola sulfīda glikuronīdos (urīnmetabolītos) un omeprazola metilsulfīdā (žults metabolītos), kā arī reducētā omeprazolā (abu veidu metabolītos). Pēc iekšķīgas 4 mg/kg devas lietošanas omeprazols ir nosakāms plazmā 9 stundas pēc lietošanas un urīnā hidroksioimeprazola un O-desmetil-omeprazola veidā pēc 24 stundām, bet nav nosakāms pēc 48 stundām. Omeprazola eliminācija notiek ātri, galvenokārt ar urīnu (43 līdz 61 % devas), mazākā apmērā ar fekālijām, bet terminālais eliminācijas pusperiods ir no 0,5 līdz 8 stundām.

Nav pierādījumu par uzkrāšanos pēc iekšķīgas atkārtotu devu lietošanas.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav piemērojama.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.
Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.
Pēc lietošanas uzlikt uzgali.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

7 ml perorāla šļirce, kas satur 7,57 g pastas un, kas sastāv no polietilēna cilindra, virzuļa un gala vāciņa ar polipropilēna dozēšanas gredzeniem.

Kartona kastītes ar 1 vai 7 perorālām šļircēm vai spainīši ar 72 perorālām šļircēm.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

7. TIRDZniecības atļaujas numurs(-i)

V/DCP/13/0030

8. Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 31/07/2013

9. Veterināro zāļu apraksta pēdējās pārskatīšanas datums

02/2025

10. Veterināro zāļu klasifikācija

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS

MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

{ KARTONA KASTĪTES UN SPAINĪŠA MARKĒJUMS }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Peptizole 370 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katrs grams satur:

Aktīvā viela: Omeprazols 370 mg/g

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

7,57g

1 perorāla šļirce

7 perorālas šļirces

72 perorālas šļirces

4. MĒRĶSUGAS

Zirgi.

5. INDIKĀCIJAS

6. LIETOŠANAS VEIDI

Iekšķīgai lietošanai.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu izmanto cilvēku uzturā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Pēc lietošanas uzlikt uzgali.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

V/DCP/13/0030

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA
{PERORĀLAS ŠĻIRCES MARKĒJUMS }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Peptizole

2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

Katrs grams satur: Omeprazols 370 mg

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
Pēc atvēršanas izlietot līdz:...

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

Peptizole 370 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

2. Sastāvs

Viens grams satur:

Aktīvā viela:

Omeprazols 370 mg

Palīgvielas:

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172) 2 mg

Eļļaina, dzeltena līdz dzeltenbrūna pasta.

3. Mērksugas

Zirgi.

4. Lietošanas indikācijas

Kuņģa čūlu ārstēšanai un novēršanai zirgiem.

5. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši brīdinājumi:

Veterinārārstam jāapsver atbilstošu diagnostikas pārbaūžu veikšanas nepieciešamība pirms terapeitisko devu režīma izvēles.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Nav ieteicams dzīvniekiem, kuri jaunāki par 4 nedēļām vai kuru ķermeņa svars ir mazāks par 70 kg.

Stress (ieskaitot augstas intensitātes snieguma treniņus un sacensības), barošana, zirgaudzēšanas un zirgkopības prakse var būt saistīti ar kuņģa čūlu veidošanos zirgiem. Personām, kuras ir atbildīgas par zirgu labsajūtu un stāvokli, ir jāapsver čūlu rašanos veicinošo faktoru samazināšana, veicot izmaiņas zirgkopības praksē, lai panāktu uzlabošanos vienā vai vairākās turpmāk minētajās jomās: stresa pazemināšana, badošanās samazināšana, palielināts rupjas barības uzņemšanas apjoms un ganību pieejamība.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Tā kā šīs veterinārās zāles var izraisīt kairinājuma un pastiprinātas jutības reakcijas, nepieļaut saskari ar ādu un acīm. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm un tās ievadot, lietot necaurlaidīgus cimdus, neēst un nedzert. Pēc lietošanas nomazgāt rokas un ādu, kas bijusi saskarē ar veterinārajām zālēm. Ja notikusi nokļūšana acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojums marķējumu ārstam. Personām, kurām pēc saskares ar šīm

veterinārajām zālēm radušās reakcijas, meklēt medicīnisko palīdzību un turpmāk izvairīties no darbībām ar šīm veterinārajām zālēm.

Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos žurkām un trušiem netika konstatēta teratogēna iedarbība.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā. Šo veterināro zāļu lietošana ķēvēm grūsnības vai laktācijas laikā nav ieteicama.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Omeprazols var kavēt varfarīna elimināciju. Cita mijiedarbība ar zālēm, ko parasti lieto zirgu ārstēšanai, nav gaidāma, lai gan nevar izslēgt mijiedarbību ar zālēm, kuras metabolizē aknu enzīmi.

Pārdozēšana:

Pieaugušiem zirgiem un kumelēm, kas vecāki par 2 mēnešiem, netika novērotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola 91 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā līdz pat 20 mg/kg.

Vaislas ērzeļiem netika novērotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības (it īpaši attiecībā uz spermas kvalitāti un reprodiktīvo uzvedību) pēc omeprazola 71 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā 12 mg/kg.

Pieaugušiem zirgiem netika novērotas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības pēc omeprazola 21 dienu ilgas ikdienas lietošanas devā 40 mg/kg.

7. Blakusparādības

Nav zināmas.

Pastiprinātas jutības reakcijas gadījumā ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <https://www.pvd.gov.lv/lv>.

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Iekšķīgai lietošanai.

Kuņģa čūlu ārstēšanai: vienu reizi dienā 28 dienas pēc kārtas devā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara (1 perorālas šļirces iedaļa/50 kg ķ.sv.); pēc tam turpmākās 28 dienas, lai mazinātu kuņģa čūlu atkārtotas rašanās iespēju ārstēšanas laikā - vienu reizi dienā ievadīt 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Ja atkārtoti radušās čūlas, ir ieteicams veikt ārstēšanu vēlreiz, lietojot omeprazolu devā 4 mg uz kg ķermeņa svara (1 perorālas šļirces iedaļa/50 kg ķ.sv.).

Ir ieteicams ārstēšanu saskaņot ar izmaiņām zirgkopības un treniņu praksē. Lūdzu skatīt arī sadaļu “Īpaši brīdinājumi”

Kuņģa čūlu novēršanai: vienu reizi dienā devā 1 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Omeprazols ir efektīvs dažādu zirgu šķirņu ārstēšanai un dažādos zirgaudzēšanas apstākļos; kumelēm jau no četrus nedēļu vecuma, kuru svars pārsniedz 70 kg, kā arī vaislas ērzeļiem.

Lai ievadītu omeprazola devu 4 mg/kg, iestatiet perorālās šļirces virzuli uz zirga svaram atbilstošās devas iedaļas. Katra perorālās šļirces iedaļa uz virzuļa nodrošina 50 kg ķermeņa svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas ievadīšanu. Vienas perorālās šļirces saturs ir paredzēts 700 kg smaga zirga ārstēšanai devu režīmā 4 mg omeprazola uz kg ķermeņa svara.

Lai ievadītu omeprazola devu 1 mg/kg, iestatiet perorālās šļirces virzuli uz devas iedaļas, kas atbilst vienai ceturtajai daļai zirga ķermeņa svara. Piemēram, lai ārstētu zirgu, kura svars ir 400 kg, iestatiet virzuli uz 100 kg. Šajā devu režīmā katra perorālās šļirces iedaļa nodrošina 200 kg ķermeņa svara ārstēšanai pietiekamas omeprazola devas ievadīšanu.

Pēc lietošanas uzlieciet uzgali.

10. Ierobežojumu periods

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu izmanto cilvēku uzturā.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc Exp.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc lietošanas uzlikt uzgali.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Recepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

7 ml perorāla šļirce, kas satur 7,57 g pastas un, kas sastāv no polietilēna cilindra, virzuļa un gala vāciņa, ar polipropilēna dozēšanas gredzeniem.

Kastītes ar 1 vai 7 perorālām šļircēm vai spainīši ar 72 perorālām šļircēm.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

02/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Laboratories Limited
105 Armagh Road
Newry
Co. Down, BT35 6PU
Lielbritānija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Magnum Veterinārija SIA
Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021, Latvija
Tel: +371 2942 3705 (24/7)

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar tirdzniecības atļaujas turētāja vietējo pārstāvi.

17. Cita informācija