

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Finadyne 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält: 50 mg Flunixin entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 50 ml
6 x 50 ml
10 x 50 ml
1 x 100 ml
10 x 100 ml
1 x 250 ml
6 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schwein.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind: Intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

Pferd: Intravenöse Anwendung.

Schwein: Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe:

4 Tage (intravenöse Anwendung).

31 Tage (intramuskuläre Anwendung).

24 Stunden (intravenöse Anwendung).

36 Stunden (intramuskuläre Anwendung).

Schweine:

Essbare Gewebe:

24 Tage (intramuskuläre Anwendung).

Pferde:

Essbare Gewebe:

5 Tage (intravenöse Anwendung).

Milch:
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH

AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNRNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 400773.00.00

AT: Z. Nr. 17774

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Durchstechflasche (Etikett für 100, 250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Finadyne 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält: 50 mg Flunixin entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin.

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schwein.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: i.m. oder i.v. Anwendung.

Schwein: i.m. Anwendung.

Pferd: i.v. Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe:

4 Tage (intravenöse Anwendung).

31 Tage (intramuskuläre Anwendung).

24 Stunden (intravenöse Anwendung).

36 Stunden (intramuskuläre Anwendung).

Schweine:

Essbare Gewebe:

24 Tage (intramuskuläre Anwendung).

Pferde:

Essbare Gewebe:

5 Tage (intravenöse Anwendung).

Milch:

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH

AT: Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche (Etikett für 50 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Finadyne

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält 50 mg Flunixin entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____