

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Überkarton

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FATROXIMIN DC 100 mg - Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder  
Rifaximin

### 2. WIRKSTOFF(E)

1 Injektor (5 ml) enthält:

**Wirkstoff:**

Rifaximin 100 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Paraffinum liquidum ad 5 ml

### 3. DARREICHUNGSFORM

Salbe zur intramammären Anwendung

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 Injektoren

8 Injektoren

12 Injektoren und 12 Reinigungstücher

60 Injektoren und 60 Reinigungstücher

### 5. ZIELTIERART(EN)

Rind (trockenstehende Milchkühe)

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Zur Behandlung subklinischer Euterentzündungen zum Zeitpunkt des Trockenstellens sowie  
- zur Behandlung und Metaphylaxe von Euterentzündungen während der Trockenstehzeit verursacht durch gegenüber Rifaximin empfindliche *Staphylococcus aureus* (einschließlich Penicillin-resistente Stämme), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* oder *Trueperella pyogenes* (*Arcanobacterium pyogenes*).

### 7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.  
Zur intramammären Anwendung.

### 8. WARTEZEIT(EN)

Essbare Gewebe: Null Tage

Das Euter behandelter Tiere ist nicht zum Verzehr geeignet.

Milch:

Behandlung früher als 35 Tage vor dem Abkalben: 0 Tage ab Laktationsbeginn

Behandlung später als 35 Tage vor dem Abkalben: 35 Tage ab dem Tag der Behandlung

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern,

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

FATRO S.p.A., I-40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z. Nr.: 8-00374

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

Etikett

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FATROXIMIN DC 100 mg - Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

1 Injektor (5 ml) enthält:  
Rifaximin 100 mg

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

5 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Zum Einbringen in das Euter

**5. WARTEZEIT(EN)**

Essbare Gewebe: Null Tage  
Das Euter behandelter Tiere ist nicht zum Verzehr geeignet.

Milch:

Behandlung früher als 35 Tage vor dem Abkalben: 0 Tage ab Laktationsbeginn.

Behandlung später als 35 Tage vor dem Abkalben: 35 Tage ab dem Tag der Behandlung.

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere.