

B. BIJSLUITER

BIJSLUITER

LACTOLYTE, poeder voor orale oplossing

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDEHouder van de vergunning voor het in de handel brengen :VIRBAC – L.I.D. – 1^{ère} Avenue – 2065 m – 06516 CARROS (FRANKRIJK)**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

LACTOLYTE, poeder voor orale oplossing

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(L)EN

Voor een zakje van 90 g :

Lactoserumpoeder.....	76.88	g
Natriumacetaat watervrij.....	4.90	g
Natriumpropionaat watervrij.....	1.92	g
Natriumchloride watervrij.....	2.92	g
Kaliumchloride watervrij.....	0.74	g
Magnesiumchloride watervrij.....	0.38	g
Monokaliumfosfaat watervrij.....	1.36	g

Hulpstof:

Kopra-olie.

4. INDICATIE(S)

LACTOLYTE, poeder voor orale oplossing is bestemd voor de behandeling van dehydratie, acidose en verlies van elektrolyten als gevolg van diarree bij kalveren.

Aanvullende behandeling op een intraveneuze rehydratietherapie.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen bekend.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (Kalveren)

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Per dier : 90 g LACTOLYTE, poeder voor orale oplossing oplossen in 2 liter water van ongeveer 38°C (wat overeenkomt met een zakje van 90 g of 4 maatlepels).

Tweemaal per dag 2 liter drank geven, gedurende 2 of 3 dagen, zonder enige andere melkvoeding. De drank moet vlak voor de toediening worden bereid. Niet verbruikte resten weggieten.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Niet van toepassing.

10. WACHTTIJD

(Orgaan)vlees : 0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25 °C.

Wanneer de drank is bereid, dient deze onmiddellijk te worden toegediend.

Houdbaarheid na de eerste opening van de primaire verpakking : de verpakkingen van 900 g en 4,5 kg direct na het openen gebruiken.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Oplossingen met elektrolyten dienen niet tegelijk met sulfonamides te worden toegediend.

**13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Mei 2017.

15. OVERIGE INFORMATIE

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

BE-V169583 (Triplex zakjes)

BE-V508942 (HDPE pot en vat)

Vrij.