

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/00/1078**

Masti Veyxym suspensija ievadišanai tesmenī liellopiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Masti Veyxym suspensija ievadišanai tesmenī liellopiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens injektors (10 g) satur:

Aktīvās vielas:

α -tokoferola acetāts (E vitamīna acetāts)	12000 mg
A vitamīna koncentrāts	100000 IU
Himotripsīns	2400 FIP-U
Tripsīns	240 FIP-U
Papaīns	6 FIP-U

4. INDIKĀCIJA(-S)

Neinfekciozu tesmeņa iekaisumu ārstēšanai govīm.

Papildu terapijai infekciozu akūtu, hronisku un subklīnisku tesmens iekaisumu ārstēšanā kombinācijā ar antibiotikām, balstoties uz antibiogrammas rezultātiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Proteolītiskos fermentus saturošas zāles (īpaši, ja tās ievadītas tesmenī) var izraisīt vairāk vai mazāk izteiktu tesmens pietūkumu. Šādi pietūkumi tiek uzskatīti par spēcīgu audu reakciju un pēc pāris dienām tie izzūd.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai tesmenī.

Pēc tesmens pilnīgas izslaukšanas, notīrīšanas un dezinfekcijas, katrā skartajā tesmens ceturksnī ievada 1 injektora saturu (10 g suspensijas).

1 - 3 lietošanas reizes 12 stundu laikā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:	nulle dienas.
Pienam:	1 diena.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā un uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Grūsnība un laktācija:

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

03/2023

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 10 injektoriem ievadīšanai tesmenī pa 10 g.