

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

UMKARTON

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix 600 mg + 3 000 mg Spot-on Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 6,0 ml Pipette mit enthält:
600 mg Imidacloprid, 3 000 mg Permethrin

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette
2 Pipetten
3 Pipetten
4 Pipetten
6 Pipetten
24 Pipetten



4. ZIELTIERART(EN)



> 40 kg ≤ 60 kg

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Vorderseite des Umkartons:

Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.

Repellierende Wirkung gegen Zecken, Stechmücken, Sandmücken und Stechfliegen.

Reduktion des Risikos der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



Leishmaniose

Nicht bei Katzen anwenden.



Rückseite des Umkartons:

Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann als Teil einer Behandlungsstrategie gegen Flohallergiedermatitis (FAD) eingesetzt werden. Bietet eine larvizide Wirkung gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung der behandelten Hunde.

Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.

Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von durch Vektoren übertragene Krankheiten bei Hunden (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).

Repellierende Wirkung gegen Stechmücken und Sandmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.

Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt zur Vorbeugung von durch Fliegenstiche verursachter Dermatitis bei.

Kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.

Behält seine Wirksamkeit auch bei Nässe.


6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Eine Pipette für Hunde $> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$

[Hundeanwendung – Piktogramm (größenspezifisch entsprechend der Produktgröße)]



Nicht bei unter sieben Wochen alten Welpen oder einem Körpergewicht von weniger als 40 kg anwenden.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen des Aluminiumbeutels innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

Nach Anbruch der Pipette sofort verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30 °C lagern.

Bewahren Sie den Aluminiumbeutel mit den Blisterpackungen im Umkarton auf.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“
--

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Elanco 

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 402402.02.00

AT: Z. Nr.: 838114

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

PIPETTE

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix



$> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

6,0 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

BLISTER

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix



$> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

6,0 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

FOLIENBEUTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix



$> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

6,0 ml

100 mg/ml Imidacloprid

500 mg/ml Permethrin

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen des Aluminiumbeutels innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.