Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation

Zeel LT ad us. vet.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221-50100
Telefax: 07221-501210
E-Mail: info@heel.de

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Zeel LT ad us. vet.

Tabletten
Homöopathisches Arzneimittel
Für Tiere

Zusammensetzung:

1 Tablette zu 301,5 mg enthält:
Wirkstoffe:

Cartilago articularis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Funiculus umbilicalis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Embryo totalis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Placenta totalis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Rhus toxicodendron Trit.	D3	30 mg
Arnica montana Trit.	D4	60 mg
Solanum dulcamara Trit.	D3	20 mg
Symphytum officinale Trit.	D8	20 mg
Sanguinaria canadensis Trit.	D4	30 mg
Sulfur Trit.	D6	40 mg
Nadidum Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 5a)	10 mg
Coenzym A Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 5a)	10 mg
Acidum thiocticum Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 6)	10 mg
Natrium diethyloxalaceticum Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 6)	10 mg

Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.

Sonstige Bestandteile:
Magnesiumstearat
Lactose-Monohydrat

Anwendungsgebiet(e)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.
Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

Zieltierart(en)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Standarddosierung:
Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind (über 500 kg): 2-3mal täglich die Einzeldosis von 10 Tabletten
Pferd, Rind (bis zu 500 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 6-8 Tabletten
Schwein: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 4 Tabletten
Schaf, Ziege: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 Tabletten
Großer Hund (über 25 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3 Tabletten
Mittlerer Hund (15-25 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 2 Tabletten
Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 1 Tablette

Die Tabletten sind einzugeben.

Initial-/Akutdosierung:
Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden die angegebene Einzeldosis verabreichen, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:
Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1 bis 4 Tagen verabreichen.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel nicht ohne tierärztliche Rücksprache über einen längeren Zeitraum gegeben werden.

Wartezeit

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: Null Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Stunden

Besondere Lagerungshinweise

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.
Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollten Zeel LT ad us. vet. Tabletten mit Vorsicht eingesetzt werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:
Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:
Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.
Wenn Zeel LT ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Weitere Angaben

Packungsgrößen: 50, 100, 250, 500 Tabletten

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: