TEXTOS DE ETIQUETADO

ETIQUETA DEL VIAL 10 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DETOSEDAN 10 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE PARA CABALLOS Y BOVINO.
Hidrocloruro de detomidina

2. CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA

Hidrocloruro de detomidina 10 mg/ml

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

10 ml

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa e intramuscular.

5. TIEMPO DE ESPERA

Caballos y bovino:
Carne: 2 días
Leche: 12 horas

6. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: {Mes/Año}
Una vez abierto el envase, utilizar antes de:

8. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario.

9. LA MENCIÓN "VÉASE EL PROSPECTO PARA INSTRUCCIONES COMPLETAS INCLUIDAS LAS ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO"

Véase el prospecto para instrucciones completas incluidas las advertencias para el usuario.

CAJA CON 1 VIAL DE 10 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DETOSEDAN 10 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE PARA CABALLOS Y BOVINO
Hidrocloruro de detomidina

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Hidrocloruro de detomidina 10 mg/ml
Parahidroxibenzoato de metilo (E 218) 1,0 mg/ml

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Vial de 10 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Caballos y bovino

6. INDICACIONES DE USO

- Para la sedación y analgesia leve en caballos y bovino, para facilitar exámenes físicos y tratamientos así como procedimientos quirúrgicos menores.

La detomidina se puede utilizar para:
- Exploraciones (por ejemplo endoscopia, exámenes rectales y ginecológicos, radiografías).
- Procedimientos quirúrgicos menores (por ejemplo, tratamientos dentales o de tendones, escisión de tumores cutáneos, tratamiento de las mamas o tratamiento de heridas).
- Antes de tratamientos o administración de medicaciones (por ejemplo utilización de sonda nasogástrica, herraje).

Para la premedicación antes de la administración de anestésicos por vía inyectable o inhalatoria

7. MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa e intramuscular**.**
Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Caballos y bovino:
Carne: 2 días
Leche: 12 horas

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN

Los agonistas alpha-2 adrenoreceptores pueden causar reacciones adversas graves. Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: finales {Mes/Año}
Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

Una vez abierto el envase, utilizar antes de:

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.
No refrigerar o congelar.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO", Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario-Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 – Barcelona
ESPAÑA

Representante del titular:
Laboratorios Karizoo, S.A.
c/Mas Pujades, 11 – 12 (Polígono industrial La Borda)
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
ESPAÑA

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2399 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}