

BIPACKSEDEL

Receptal vet., 4,2 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning,

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.
P.O. Box 31
NL-5830 AA Boxmeer
Nederländerna

Tillverkare:

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
DE-86716 Unterschleissheim
Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Receptal vet., 4,2 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
Buserelinacetat

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Buserelinacetat 4,2 mikrogram per ml
Bensylalkohol 20 mg, natriumklorid 4,5 mg, natriumdivätefosfat 1 H₂O 2,5 mg, natriumhydroxid 0,1 mg och vatten för injektionsvätskor 986,9 mg.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)

Follikelcystor i äggstockarna hos nötkreatur (kvigor/kor) och styrning av ägglossning hos ston med aktivitet i äggstockarna.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Nötkreatur (kvigor/kor), hästar (ston).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges företrädesvis som intramuskulär injektion, men även som intravenös eller subkutan injektion.

Nötkreatur:

Cystor i äggstockarna 5 ml

Hästar:

Styrning av tidpunkt för ägglossning 10 ml

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Kan administreras till djur oberoende av laktationsstadium (digivningsstadium).

10. KARENSTID

Noll dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Ljuskänsligt.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar vid förvaring i högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

På grund av risken för effekter på fortplantningsförmågan, bör fertila kvinnor hantera denna produkt med försiktighet. Gravida kvinnor bör inte administrera produkten.

Försiktighet bör iaktas vid administrering av produkten för att undvika oavsiktlig självinjektion.

Uppsök genast läkare vid oavsiktlig självinjektion och visa bipacksedeln eller etiketten. Undvik att produkten kommer i kontakt med ögon och hud. Skölj noga med vatten vid oavsiktlig ögonkontakt.

Tvätta genast det utsatta området med tvål och vatten vid oavsiktlig hudkontakt med produkten.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2022-01-21

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Glasflaska 10 ml: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.