

Prospetto delle caratteristiche del prodotto.

a. Nome:
Sulfachinossalina 20% liquido Chemifarma

b. Composizione qualitativa e quantitativa:
1 kg contiene:

Principi attivi	
Sulfachinossalina	200 g

Eccipienti:	
Monoetanolammina	100 g
Polietilenglicole 200 q.b. a	1.000 g

c. Forma farmaceutica:
soluzione da somministrare per via orale diluita in acqua da bere.

d. Proprietà farmacologiche:

La Sulfachinossalina è un sulfamidico il cui meccanismo di azione rispecchia quello della cui appartiene. Infatti il nucleo base attivo, componente comune a tutti i sulfamidici, è la "sulfanilamide": struttura che, sostituendosi a quella dell'acido paraaminobenzoico (PABA) nel momento in cui esso viene incorporato da parte dei germi, impedisce la combinazione del PAB stesso con il 2-amino-4-idrossi-7,8-diidrossi-pteridina-6-metanolo: molecola precursore dell'acido folico. L'acido folico ed il suo derivato, l'acido folinico (fattore citrovorum) sono fattori di crescita interessati al metabolismo delle purine e delle pirimidine (componenti del DNA e RNA) ed al metabolismo degli amminoacidi (biosintesi delle proteine). Lo spettro di attività del medicinale è specificatamente mirato sulle Coccidiosi, Bordetella e Clostridium. Il medicinale, una volta assunto per via orale, viene rapidamente assorbito (raggiunge la sua massima concentrazione nel sangue dopo circa 4 ore) e distribuito in tutti i tessuti. La Sulfachinossalina viene in gran parte acetilata nel fegato, mentre la restante quota immodificata viene principalmente eliminata tramite i reni.

e. Proprietà cliniche.

e.1. Specie di destinazione ed indicazioni.

Polli da carne (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano):
enteriti batteriche, coccidiosi.

Conigli:
coccidiosi, salmonellosi.

e.2. Contraindicationi:

Non somministrare per un periodo di tempo prolungato. Non somministrare ad animali sensibili ai sulfamidici o ad animali con affezioni renali.

e.3. Effetti indesiderati:

Si possono verificare casi di anafilassi in soggetti sensibilizzati.

e.4. Precauzioni speciali da prendere durante l'impiego:

evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.

I liquami provenienti dagli animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati per

scopi agricoli.

e.5. Impiego nel corso della gravidanza e dell'allattamento:

l'impiego va effettuato solo in caso di effettiva necessità e sotto controllo del medico veterinario.

e.6. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione:

nessuna nota.

e.7. Posologia e metodo di somministrazione.

e.7.1. Posologia:

Il prodotto deve essere somministrato nell'acqua di bevanda, secondo le indicazioni del Medico Veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg di p.a./kg p.v. giornaliero autorizzata.

Polli da carne e conigli: 30 g di prodotto/100 kg p.v. (pari a 60 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3 - 5 giorni.

e.7.2. Metodo di somministrazione:

Diluire accuratamente nell'acqua alle dosi indicate.

Non miscelare in mangimi solidi.

e.7.2. Istruzioni per un corretto utilizzo:

per una corretta somministrazione eliminare dagli abbeveratoi l'acqua residua e somministrare, come unica fonte di bevanda, quella medicata nella quantità stabilita dal medico veterinario. L'acqua medicata va rinnovata ogni 12 ore. Si somministri acqua non medicata al termine della terapia.

e.8. Dosi eccessive:

non superare le dosi consigliate.

e.9. Avvertenze speciali per le specie di destinazione:

non somministrare a galline che producono uova destinate al consumo umano.

e.10. Tempi di attesa:

Conigli: 22 giorni

Polli da carne: 35 giorni

e.11. Precauzioni speciali per la persona che somministra il medicinale:

è buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto. Utilizzare un paio di guanti protettivi per somministrare il medicinale. Non mangiare, bere o fumare durante la sua manipolazione. In caso di contaminazione accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone.

f. Particolari farmaceutici.

f.1. Incompatibilità gravi:

Eccessiva acidità delle bevande.

f.2. Periodo massimo di impiego.

f.2.1. Periodo di validità del prodotto correttamente conservato:
24 mesi, in confezione integra.

f.2.2. Periodo di validità dopo la prima apertura della confezione:
se accuratamente richiusa ed adeguatamente conservata, il medicinale può essere
impiegato per 30 giorni.

f.2.3. Periodo di validità dell'acqua da bere medicata:
l'acqua medicata non consumata va eliminata dopo 12 ore.

f.3. Conservazione del prodotto:
conservare in luogo fresco ed oscurato. L'acqua medicata deve essere conservata in
luogo fresco ed oscurato.

f.4. Natura e contenuto dei recipienti:
bottiglie da 100 g e da 1000 g in polietilene ad alta densità, chiuse da un tappo in
polietilene con chiusura di sicurezza di tipo "salvabimbo".
taniche da 5 kg e da 10 kg in polietilene ad alta densità, chiuse da un tappo in
polietilene con chiusura di sicurezza.

Il contenuto è rappresentato da una soluzione limpida di colore giallo bruno.

f.5. Ragione sociale e sede del titolare dell'autorizzazione alla immissione in
commercio:
Chemifarma S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì.

f.6. Precauzioni speciali da prendere per eliminare il medicinale veterinario inutilizzato e/o
i materiali di rifiuto:
eliminare secondo le normative vigenti.

testo della etichetta esterna (confezione da 100 g).

Sulfachinossalina 20% - liquido - Chemifarma

Medicinale veterinario prefabbricato

COMPOSIZIONE.

Ogni g contiene:

Principi attivi:

Sulfachinossalina

mg 200

Eccipienti: q. b. a

g 1,00.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO:

eliminare dagli abbeveratoi l'acqua residua e somministrare, come unica fonte di bevanda, quella medicata con "Sulfachinossalina 20%" nella quantità stabilita dal medico veterinario. L'acqua medicata va rinnovata ogni 12 ore. Si somministri acqua non medicata al termine della terapia.

NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI. NON SOMMINISTRARE A GALLINE CHE PRODUCONO UOVA PER IL CONSUMO UMANO.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA PERSONA CHE SOMMINISTRA IL PRODOTTO:

E' buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. Utilizzare un paio di guanti per somministrare il medicinale.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO.

Il prodotto deve essere somministrato nell'acqua di bevanda, secondo le indicazioni del Medico Veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg/kg p.v. giornaliero autorizzata.

Polli da carne e conigli: 30 g di prodotto/100 kg p.v. (pari a 60 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3 - 5 giorni.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE.

Polli da carne: enteriti batteriche, coccidiosi.

Conigli: coccidiosi, salmonellosi.

TEMPI DI ATTESA.

Conigli: 22 giorni

Polli da carne: 35 giorni

CONTROINDICAZIONI:

non somministrare per un periodo di tempo prolungato. Non somministrare ad animali sensibili ai sulfamidici o ad animali con affezioni renali.

EFFETTI INDESIDERATI:

si possono verificare casi di anafilassi in soggetti sensibilizzati.

PRECAUZIONI DA OSSERVARE DURANTE L'IMPIEGO:

evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

“Sulfachinossalina 20%” deve essere conservato in luogo fresco ed oscurato.

PERIODO DI VALIDITA' DEL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE INTEGRA E CORRETTAMENTE CONSERVATA:

24 mesi. Dopo prima apertura la confezione, se accuratamente richiusa ed adeguatamente conservata, può essere impiegato per 30 giorni.

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO INUTILIZZATO E DEI MATERIALI DI SCARTO:
operare secondo le vigenti normative nazionali e regionali.

I liquami provenienti dagli animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati per scopi agricoli.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLOCOPIA NON RIPETIBILE (in rosso).

PER USO VETERINARIO (in rosso).

DESTINATO A:
Polli da carne, conigli.

Lotto n°

del

Scadenza (si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservata):

Peso netto: 100 g.

N° di A.I.C. 101987016

Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio, fabbricante e sede dello stabilimento di produzione:

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì.

testo della etichetta esterna (confezione da 1000 g).

Sulfachinossalina 20% - liquido - Chemifarma

Medicinale veterinario prefabbricato

COMPOSIZIONE.

Ogni g contiene:

Principi attivi:

Sulfachinossalina mg 200

Eccipienti: q. b. a g 1,00.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO:

eliminare dagli abbeveratoi l'acqua residua e somministrare, come unica fonte di bevanda, quella medicata con "Sulfachinossalina 20%" nella quantità stabilita dal medico veterinario. L'acqua medicata va rinnovata ogni 12 ore. Si somministri acqua non medicata al termine della terapia.

NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI. NON SOMMINISTRARE A GALLINE CHE PRODUCONO UOVA PER IL CONSUMO UMANO.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA PERSONA CHE SOMMINISTRA IL PRODOTTO:

E' buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. Utilizzare un paio di guanti per somministrare il medicinale.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO.

Il prodotto deve essere somministrato nell'acqua di bevanda, secondo le indicazioni del Medico Veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg/kg p.v. giornaliero autorizzata.

Polli da carne e conigli: 30 g di prodotto/100 kg p.v. (pari a 60 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3 - 5 giorni.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE.

Polli da carne: enteriti batteriche, coccidiosi.

Conigli: coccidiosi, salmonellosi.

TEMPI DI ATTESA.

Conigli: 22 giorni

Polli da carne: 35 giorni

CONTROINDICAZIONI:

non somministrare per un periodo di tempo prolungato. Non somministrare ad animali sensibili ai sulfamidici o ad animali con affezioni renali.

EFFETTI INDESIDERATI:

si possono verificare casi di anafilassi in soggetti sensibilizzati.

PRECAUZIONI DA OSSERVARE DURANTE L'IMPIEGO:

evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

“Sulfachinossalina 20%” deve essere conservato in luogo fresco ed oscurato.

PERIODO DI VALIDITA' DEL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE INTEGRA E CORRETTAMENTE CONSERVATA:

24 mesi. Dopo prima apertura la confezione, se accuratamente richiusa ed adeguatamente conservata, può essere impiegato per 30 giorni.

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO INUTILIZZATO E DEI MATERIALI DI SCARTO:
operare secondo le vigenti normative nazionali e regionali.

I liquami provenienti dagli animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati per scopi agricoli.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLOCOPIA NON RIPETIBILE (in rosso).

PER USO VETERINARIO (in rosso).

DESTINATO A:
Polli da carne, conigli.

Lotto n°

del

Scadenza (si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservata):

Peso netto: 1000 g.

N° di A.I.C. 101987028

Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio, fabbricante e sede dello stabilimento di produzione:

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì.

testo della etichetta esterna (confezione da 5 kg).

Sulfachinossalina 20% - liquido - Chemifarma

Medicinale veterinario prefabbricato

COMPOSIZIONE.

Ogni g contiene:

Principi attivi:

Sulfachinossalina mg 200

Eccipienti: q. b. a g 1,00.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO:

eliminare dagli abbeveratoi l'acqua residua e somministrare, come unica fonte di bevanda, quella medicata con "Sulfachinossalina 20%" nella quantità stabilita dal medico veterinario. L'acqua medicata va rinnovata ogni 12 ore. Si somministri acqua non medicata al termine della terapia.

NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI. NON SOMMINISTRARE A GALLINE CHE PRODUCONO UOVA PER IL CONSUMO UMANO.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA PERSONA CHE SOMMINISTRA IL PRODOTTO:

E' buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. Utilizzare un paio di guanti per somministrare il medicinale.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO.

Il prodotto deve essere somministrato nell'acqua di bevanda, secondo le indicazioni del Medico Veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg/kg p.v. giornaliero autorizzata.

Polli da carne e conigli: 30 g di prodotto/100 kg p.v. (pari a 60 mg di principio attivo/kg p.v.) in funzione dell'età, del peso e del consumo di acqua degli animali, per 3 - 5 giorni.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE.

Polli da carne: enteriti batteriche, coccidiosi.

Conigli: coccidiosi, salmonellosi.

TEMPI DI ATTESA.

Conigli: 22 giorni

Polli da carne: 35 giorni

CONTROINDICAZIONI:

non somministrare per un periodo di tempo prolungato. Non somministrare ad animali sensibili ai sulfamidici o ad animali con affezioni renali.

EFFETTI INDESIDERATI:

si possono verificare casi di anafilassi in soggetti sensibilizzati.

PRECAUZIONI DA OSSERVARE DURANTE L'IMPIEGO:

evitare la somministrazione in acque eccessivamente acide.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

“Sulfachinossalina 20%” deve essere conservato in luogo fresco ed oscurato.

PERIODO DI VALIDITA' DEL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE INTEGRA E CORRETTAMENTE CONSERVATA:

24 mesi. Dopo prima apertura la confezione, se accuratamente richiusa ed adeguatamente conservata, può essere impiegato per 30 giorni.

ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO INUTILIZZATO E DEI MATERIALI DI SCARTO:
operare secondo le vigenti normative nazionali e regionali.

I liquami provenienti dagli animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati per scopi agricoli.

DA VENDERSI SOLTANTO DIETRO PRESENTAZIONE DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA IN TRIPLOCOPIA NON RIPETIBILE (in rosso).

PER USO VETERINARIO (in rosso).

DESTINATO A:
Polli da carne, conigli.

Lotto n°

del

Scadenza (si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservata):

Peso netto: 5 kg.

N° di A.I.C. 101987030

Titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio, fabbricante e sede dello stabilimento di produzione:

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì.

