

## ЛИСТОВКА

### 1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

БИОВИТ 10% премикс за медикаментозен фураж за свине, пилета, пуйки и патици

### 2. Състав

В 1 g от продукта се съдържат:

#### Активно вещество:

Chlortetracycline (като chlortetracycline hydrochloride) 100.0 mg

### 3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Свине, пилета, пуйки и патици.

### 4. Показания за употреба

За лечение и контрол на респираторни и системни инфекции, предизвикани от чувствителни към хлортетрациклин бактерии: за лечение на лептоспироза, бактериален ентерит, бактериална пневмония, цервикални абсцеси при свине; за лечение на хронична респираторна болест, коли-инфекции, ентерит, инфекциозен синовит при пилета; за лечение на хексамитиаза, инфекциозен синовит, паратиф и бактериален ентерит при пуйки; за лечение на птича холера при патици.

### 5. Противопоказания

Да не се използва при системни инфекции, предизвикани от *Escherichia coli* и *Salmonella* spp.

Да не се използва при преживни животни с функциониращи предстомашия.

Да не се използва при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.

Да не се използва при бременни животни 2-3 седмици преди раждането и до 4 седмична възраст на новородените.

Да не се използва при животни с нарушен апетит и при повръщане.

Да не се използва при коне и котки.

### 6. Специални предупреждения

#### Специални предупреждения:

Употребата на продукта трябва да се основава на тест за чувствителност на бактериите, изолирани от животното. Ако това не е възможно, лечението трябва да се основава на местна (регионална и на ниво ферма) епидемиологична информация относно чувствителността на прицелните бактерии, както и да се вземат под внимание официалните национални антимикробни политики.

#### Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Няма.

#### Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта.

Измийте ръцете си след употреба.

#### Бременност и лактация:

Не се прилага при бременни животни 2-3 седмици преди раждането и до 4 седмична възраст на новородените.

Да не се използва при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:  
Да не се прилага (като медикаментозен фураж) едновременно с продукти на калция и тежките метали, тъй като резорбцията на хлортетрациклина се затруднява в присъствието на йоните на калция, желязото, алуминия, мангана и други метали в резултат на образуването на неразтворими хелатни комплекси.

Предозиране:

Хлортетрациклинът е ниско токсичен и е безвреден, когато се прилага в препоръчаните дози. В редки случаи при предозиране може да предизвика диария, което налага спиране на третирането и прилагане на подходящо лечение.

Основни несъвместимости:

Хлортетрациклинът е несъвместим с пеницилин и стрептомицин, и други химиотерапевтици с бактерицидно действие.

**7. Неблагоприятни реакции**

Няма.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване.

**8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**

Начин на приложение:

Перорално, добре размесен с фуража, през 12 часа.

Дозировка:

Вид животни	Дози, kg/t фураж
Пилета	2,0-4,0 kg; при хронична респираторна болест – 2,0-4,0 kg; при коли-инфекции – 5,0 kg; при ентерит, инфекциозен синовит – 1,0-2,0 kg.
Пуйки	3,0-4,0 kg; при хексамитиаза – 4,0 kg; при инфекциозен синовит – 2,0 kg; при паратиф до 4-седмична възраст – 4,0 kg; при бактериален ентерит*.
Патици	3,0-4,0 kg; при птича холера – 2,0-4,0 kg.
Свине	При лептоспироза – 4,0-6,0 kg, при тежки случаи до 10 kg; при бактериален ентерит**; при бактериална пневмония**.

\* срещу бактериален ентерит при пуйки дозата е 550 mg/kg т.м./24 h, прибавен към фуража;

\*\* срещу бактериален ентерит и бактериална пневмония при свине дозата е 220 mg/kg т.м./24 h, прибавен към фуража.

## **9. Съвет за правилното прилагане на продукта**

Препоръчително е за равномерното смесване с фуража, изчисленото количество от продукта (изхождайки от указаната дозировка), да се смесва постепенно: до 10 kg фураж, до 100 kg фураж, до 1000 kg фураж.

## **10. Карентни срокове**

### Птици

Месо и вътрешни органи: 7 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

### Свине

Месо и вътрешни органи: 7 дни.

## **11. Специални условия за съхранение**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след Exp.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 3 месеца.

Срок на годност след размесване с фуража (съхранение при температура под 25 °С): 3 месеца.

## **12. Специални предпазни мерки при унищожаване**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

## **13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

## **14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки**

0022-1678

Биовит 20% премикс за медикаментозен фураж се предлага в книжно-полиетиленови торби от 5 kg и 25 kg и сашета от 500 g.

**15. Дата на последната редакция на текста**

04/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Данни за връзка**

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговорящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

„БИОВЕТ” АД

ул. „Петър Раков” № 39

гр. Пещера 4550

България

Телефон: (0350) 656-19

Факс: (0350) 656-36; (0350) 656-07

E-mail: [biovet@biovet.com](mailto:biovet@biovet.com)

**17. Допълнителна информация**

X

---

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП