Gebrauchsinformation

Vetokehl Nig D5

Tabletten

Für Tiere

Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Geflügel, Heimtiere (z.B. kleine Nagetiere, Ziervögel)

Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff:

Aspergillus niger e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 Trit.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **Vetokehl Nig D5** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Zieltierarten:

Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Geflügel, Heimtiere (z.B. kleine Nagetiere, Ziervögel)

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

bei Pferden und Rindern: Tabletten	1 x täglich	2-3
bei Fohlen, Kälbern, Schweinen, Ziegen, Schafen: Tabletten	1 x täglich	1-2
bei Hunden, Katzen, Ferkeln:	1 x täglich	1 Tablette
bei Geflügel, kleinen Nagetieren und Ziervögeln: Tablette	1 x täglich	1

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden.

Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode:

Zur Verträglichkeit von **Vetokehl Nig D5** bei trächtigen und laktierenden Tieren sowie bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation bzw. während der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Ziege, Schaf, Geflügel

Essbares Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Eier: 0 Tage

Besondere Lagerhinweise:

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25°C!

Das Verfalldatum ist auf dem Blisterstreifen und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

250 mg *Aspergillus niger* e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 Trit. (HAB, Vorschrift 6)

Darreichungsform und Inhalt:

10 / 20/ 100 (10 x 10) / 200 (10 x 20) Tabletten zum Eingeben

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG

Hasseler Steinweg 9

27318 Hoya

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 9928.00.00

Stand der Gebrauchsinformation:

Hinweis:

Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **Vetokehl Nig D5** Flüssige Verdünnung und Flüssige Verdünnung zur Injektion zur Verfügung.