

BIPACKSEDEL

Apiguard vet 12,5 g gel för honungsbin

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Irland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:

Cicieffe s.r.l.
via. G. Marconi n. 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Italien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Apiguard vet 12,5 g gel för honungsbin

3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Tymol 12,5 g/tråg

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Behandling av *Varroa destructor* infestation

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga kända

6. BIVERKNINGAR

Bikolonin kan bli orolig under behandlingen.

Vid höga temperaturer kan även antalet biyngel minska under behandlingsperioden, detta är emellertid övergående och påverkar inte kolonins utveckling.

Lokalt kan ibland yngel städas ut i behandlade samhällen. Normalt beteende för bina är att de avlägsnar gelén i brickan ovanför yngelramar utan att det påverkar samhället, dock kan vissa raser med hög "städvilja" städa ut icke täckt yngel i närheten av Apiguard brickan. Om detta observeras, ta bort läkemedlet ifrån bisamhället.

7. DJURSLAG

Honungsbin (*Apis mellifera*).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Användning i bikupa: ett tråg à 50 g gel per koloni. Efter 2 veckor sätt in nytt tråg à 50 g gel. En behandling = 2 tråg.
Maximalt två behandlingar per år.

Administreringssätt

Öppna bikupan. Dra av folielocket från tråget tills det bara sitter fast i ett hörn. Placera det öppna tråget i mitten ovanpå ramarna med gelsidan uppåt.
Kontrollera att det blir minst 0,5 cm fritt utrymme mellan trågets ovansida och bikupans lock. Stäng bikupan. Ta bort tråget efter två veckor och sätt dit ett nytt tråg på samma sätt. Lämna tråg nummer två i bikupan tills tråget är tomt. Ta bort tråget när skattlådorna installeras.

Läkemedlets effekt maximeras om den används på sensommaren efter honungsskörden (när antalet biyngel minskar). Vid allvarliga angrepp kan läkemedlet emellertid även användas på våren när temperaturen är över 15 °C.

Effekten kan variera mellan olika kolonier på grund av applikationssättet. Apiguard vet bör därför användas som en behandling bland flera andra i ett integrerat program för skadedjursbekämpning och regelbunden kontroll av nedfallet kvalster. Vid observation av ytterligare stora kvalsternedfall följande vinter eller vår rekommenderas en andra vinter- eller vårbehandling för varroa.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Behandlingen kan genomföras omedelbart efter det att skattlådorna tagits bort.
Sammanför svaga kolonier före behandling.
Alla kolonier i en bikupa bör behandlas samtidigt.

10. KARENSTID

Honung: Noll dagar.
Använd inte läkemedlet under honungsdrag.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 30 °C.
Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen.
Skyddas från direkt solljus.
Skall ej förvaras nära bekämpningsmedel eller andra kemiska ämnen som skulle kunna kontaminera läkemedlet.
Förvaras åtskilt från livsmedel.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Försiktighet bör iakttas för att säkerställa rätt dosering, eftersom fel dosering kan få skadliga effekter på kolonin.

Behandling skall inte genomföras under honungsdrag, för att undvika påverkan på honungssmaken. Använd inte läkemedlet när den maximala dagstemperaturen under behandlingen förväntas underskrida 15 °C eller när aktiviteten i kolonin är mycket låg, eller när temperaturen överstiger 40 °C.

En större dos än rekommenderat kan orsaka störningar i kolonins beteende (oro, rymning eller ökad dödlighet). Avlägsna överflödigt läkemedel från kolonin vid överdosering.

Försiktighetsåtgärder för användaren

Undvik direktkontakt med hud och ögon på grund av risk för ögon-/hudirritation och risk för kontaktdermatit.

Använd ogenomträngliga handskar utöver gängse skyddsutrustning vid hantering av läkemedlet.

Tvätta händer och material som varit i direkt kontakt med gelen med tvål och vatten.

Vid hudkontakt, tvätta området noggrant med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt, skölj rikligt med rinnande, rent vatten och uppsök läkare.

Andas inte in läkemedlet.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-04-20