

BIPACKSEDEL
Bimoxyl vet 150 mg/ml injektionsvätska, suspension

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsssats:

Bimeda Animal Health Limited
2, 3, 4 Airton Close
Tallaght
Dublin 24, Irland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Bimoxyl vet 150 mg/ml injektionsvätska, suspension
amoxicillintrihydrat

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml Bimoxyl vet. injektionsvätska innehåller:

Aktiv substans

Amoxicillintrihydrat (motsvarande 150 mg amoxicillin)	172.0 mg
Injektionsvätska, suspension. Vit till svagt grå-brun oljesuspension.	

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)

Bakteriellt orsakade luftvägsinfektioner hos nötkreatur.
Bakteriella infektioner hos svin, t ex ledinfektioner samt luftvägsinfektioner orsakade av *Actinobacillus pleuropneumoniae* och *Pasteurella spp.*
Bakteriella infektioner hos hund, t ex respiratoriska infektioner i övre och nedre luftvägarna, gastrointestinala infektioner, urogenitalinfektioner, sårinfektioner och abscesser.

5. KONTRAIKATIONER

Överkänslighet för penicillin.

6. BIVERKNINGAR

Gastrointestinala störningar och allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma.
Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Nöt, svin och hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Normaldosen av amoxicillin är 15 mg/kg kroppsvikt (= 1 ml/10 kg).

Nöt och svin doseras intramuskulärt en gång dagligen i 3-5 dagar. Om den administrerade volymen överskrider 20 respektive 5 ml fördelas dosen på två eller flera injektionsställen.

Hund doseras subkutant. Om volymen överskrider 2.5 ml fördelas dosen på två eller flera injektionsställen.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Omskakas före användning.

.

10. KARENSTID(ER)

Slakt: Nöt 30 dygn, svin 11 dygn.

Mjölk: 4 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan och kartongen efter Utg.dat.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Inga särskilda.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Inga särskilda.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Hudkontakt skall undvikas.

Dräktighet och digivning:

Kan användas under dräktighet och laktation.

Blandbarhetsproblem:

Får ej komma i kontakt med vatten eftersom detta orsakar hydrolys av amoxicillin.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2022-01-26

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: 1x100 ml, 12 x 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.