

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/02/1526

Panacur Granules 222 mg/g granulas zirgiem, liellopiem, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International B.V.

Wim de Kórverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet Ges.m.b.H.

Siemensstraße 107

1210 Wien

Austrija.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Panacur Granules 222 mg/g granulas zirgiem, liellopiem, suņiem un kaķiem

Fenbendazole

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g granulu satur:

Aktīvā viela:

Fenbendazols 222 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Kuņģa-zarnu trakta un elpošanas trakta nematožu, kāpuru un pieaugušu stadiju, invāzijas ārstēšanai liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem. Fenbendazolam piemīt ovicīda iedarbība pret veltņtārpu olīņām. Tas iedarbojas arī uz lenteņiem.

Šādu, pret fenbendazolu jutīgu endoparazītu, ārstēšanai:

Zirgiem:

Lielie un mazie strongiļi, cērmes, spalīši un strongiloīdu sugas.

Liellopiem:

Haemonchus spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Trichuris* spp., *Strongyloides* spp., *Oesophagostomum* spp., *Capillaria* spp., *Dictyocaulus* spp. un *Moniezia* spp.

Suņiem:

Kuņģa-zarnu trakta veltņtārpu un lenteņu pieaugušo stadiju invāzijas ārstēšanai suņiem.

Cērmes (*Toxocara canis*, *Toxocara leonina*), āktārpi (*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*), matgalvji (*Trichuris vulpis*), lenteņi (*Taenia* spp.), *Oslerus osleri* un giardijas (*Giardia* spp.).

Kucēniem:

Cērmes (*Toxocara* spp.), matgalvji (*Trichuris* spp.), āķtārpi (*Ancylostoma* spp.) un giardijas (*Giardia* spp.).

Kaķiem:

Kuņģa-zarnu trakta veltņtārpu un lenteņu kāpuru un pieaugušo stadiju invāzijas ārstēšanai.

Cērmes (*Toxocara mystax* (pieauguši indivīdi)), āķtārpi (*Ancylostoma tubaeforme* (pieauguši indivīdi un kāpuri)), lenteņi (*Taenia* spp. (pieauguši indivīdi)) un *Aelurostrongylus abstrusus*.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos suņiem un kaķiem var novērot kuņģa-zarnu trakta traucējumus (piemēram: vemšana un caureja).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Tikai iekšķīgai lietošanai.

Lai nodrošinātu atbilstošu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Lietošanai kopā ar dzīvnieku barību.

Liellopiem un zirgiem:

Ieteicamā deva ir 7,5 mg fenbendazola/kg ķermeņa svara, kas atbilst 5 g Panacur Granules uz 150 kg ķermeņa svara.

Strongyloides westeri izraisītas diarejas ārstēšanai kumeļiem ieteicamā deva ir 50 mg fenbendazola/kg ķermeņa svara.

Ģlotādās iecistējušos mazo strongiļu kāpuru iznīcināšanai ieteicamā deva ir 7,5 mg fenbendazola/kg ķermeņa svara 5 dienas pēc kārtas.

Suņiem un kaķiem:

Ieteicamā deva ir 50 mg fenbendazola/kg ķermeņa svara 3 dienas pēc kārtas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms un pēc attārpošanas nav nepieciešami ierobežojumi ēdināšanā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas.

Pienam: 4 dienas.

Zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārājām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jāievēro piesardzība, lai izvairītos no sekojošām darbībām, jo tās var palielināt rezistences veidošanās risku un tā rezultātā ārstēšana var būt neefektīva:

- Pārāk bieža un atkārtota vienas klases antihelmintisko līdzekļu lietošana ilgstošā laika periodā.
- Pārāk mazu devu lietošana, kas iespējama, kļūdaini noskatot ķermeņa svaru, un zāļu nepiemērotas lietošanas dēļ vai lietojot nekalibrētu dozētājierīci (ja tāda ir).

Klīniskos gadījumos, kad ir aizdomas par rezistenci pret antihelmintiskajiem līdzekļiem, jāveic turpmāki izmeklējumi, izmantojot atbilstošus pārbaudes testus (piem., oliņu skaita samazināšanas analīze fēcēs). Ja analīžu rezultāti liecina par rezistenci pret noteiktu antihelmintisko līdzekli, jālieto citai farmakoloģiskajai klasei piederošs antihelmintiskais līdzeklis ar atšķirīgu darbības mehānismu.

Ir ziņojumi par kuņģa-zarnu trakta nematožu rezistenci pret benzimidazoliem zirgiem un liellopiem. Tāpēc šo zāļu lietošana jāpamato ar vietējo epidemioloģisko informāciju par nematožu jutību un rekomendācijām, kā ierobežot turpmāku rezistences veidošanos pret antihelmintiskajiem līdzekļiem.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Pirms devas aprēķināšanas nosakiet ķermeņa svaru, cik vien precīzi iespējams.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Līdz minimumam jāsamazina tiešs kontakts ar ādu. Pēc lietošanas mazgājiet rokas.

Grūsnība un laktācija:

Liellopi un zirgi:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Suņi un kaķi:

Drīkst lietot grūsnām kucēm. Tā kā ļoti retos gadījumos suņiem un kaķiem nevar pilnībā izslēgt teratogēnu ietekmi, tāpēc pirmajos divos grūsnības trimestros lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Benzimidazoliem ir augsta drošas lietošanas robeža. Nav zināmi specifiski pārdozēšanas simptomi.

Nav nepieciešama specifiska ārstēšana.

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārājām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Šīs zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

10/2016

15. CITA INFORMĀCIJA

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
Recepšu veterinārās zāles.