

## ETIQUETA-PROSPECTO

CN: 571779.1  
25 kg

### OXISAN PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

#### COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (CIH) 27,5 g; Excipiente c.s.p. 100 g

#### INDICACIONES:

Terneros: enteritis bacterianas, neumonías, fiebre del transporte.

Cerdos: enteritis bacterianas, rinitis atrófica, leptospirosis.

#### CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS:

Posible sobreinfección de la flora intestinal por predominio de gérmenes resistentes, especialmente hongos.

#### ESPECIES DE DESTINO, DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Terneros y cerdos. Vía oral, mezclado con el pienso.

#### **Terneros:**

*Enteritis bacteriana:* 110 g / Tm de pienso (equivalente a 0,4 kg OXISAN / Tm pienso) desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición.

*Neumonías:* 500 g / Tm de pienso (equivalente a 1,82 kg OXISAN/ Tm pienso) durante 7 a 14 días según la gravedad del curso.

*Fiebre del transporte:* 110 g / Tm de pienso (equivalente a 0,4 kg OXISAN/ Tm pienso) hasta la remisión de los síntomas.

#### **Cerdos**

*Enteritis bacteriana:* Animales menores de 6 semanas de edad: 220 g / Tm de pienso (equivalente a 0,8 kg OXISAN/ Tm pienso) desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición. Animales mayores de 6 semanas: 110 g / Tm de pienso (equivalente a 0,4 kg OXISAN/ Tm de pienso) desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición

*Rinitis atrófica:* 55 g /Tm de pienso (equivalente a 0,2 kg OXISAN / Tm pienso) hasta la remisión de los síntomas.

*Leptospirosis:* 550 g /Tm de pienso (equivalente a 2 kg OXISAN / Tm pienso) durante 2 semanas.

#### UTILIZACION DURANTE GESTACION Y LACTANCIA:

No administrar a hembras en gestación.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-07

**ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO:**

En cerdos, no administrar entre 2 días antes y 10 días después de la vacunación contra el mal rojo.

**INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE EMPLEO:**

Evitar el contacto con la piel y mucosas. Usar guantes y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla. Mezclar bien con el pienso para asegurar una distribución homogénea.

**INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:**

No administrar de forma conjunta con antibióticos bactericidas.  
No administrar con cationes polivalentes (sales de calcio, leche y productos lácteos).  
Se presentan resistencias cruzadas entre los miembros del grupo.

**INCOMPATIBILIDADES**

No administrar con soluciones férricas y cálcicas.  
No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

**TIEMPO DE ESPERA:**

CARNE: Terneros y cerdos: 7 días.

**PERÍODO DE VALIDEZ:**

Para la premezcla tiene un período de validez de 3 años.  
Para pienso medicado y para el envase abierto tiene una validez de 3 meses.

**PRESENTACIÓN**

Sacos de 25 kg

**PRECAUCIONES PARTICULARES DE CONSERVACION**

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

**PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

**Nº Reg:** 1322 ESP

**PRESENTACIÓN:** Sacos de 25 kg

**PRESCRIPCIÓN VETERINARIA**



## **PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS**

**Lote:**

**Cad:**

## **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17 km 17

08150 Parets del Vallès (Barcelona)

España