

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Doboz 24 fecskendőnek

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Clamox LC intramammális szuszpenzió tejelő teheneknek A.U.V.
Amoxicillin (trihidrát formájában)
Klavulánsav (kálium-klavulanát formájában)
Prednizolon

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Minden 3 g-os fecskendő tartalmaz:
Amoxicillin (trihidrát formájában): 200 mg
Klavulánsav (kálium-klavulanát formájában): 50 mg
Prednizolon: 10 mg

3. GYÓGYSZERFORMA

Intramammális szuszpenzió

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

24x3 g

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha (tejelő tehen)

6. JAVALLAT(OK)

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Intramammális alkalmazásra.
Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Hús és egyéb ehető szövetek: 7 nap.
Tej: 84 óra, pl. napi kétszeri fejés esetén 7 fejés, napi háromszori fejés esetén 11 fejés.

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK

A készítmény csak klinikai tüdőgyulladás kezelésére használható.
Amikor csak lehetséges, a készítményt antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok alapján kell alkalmazni.

10. LEJÁRATI IDŐ

EXP {hónap/év}

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25°C alatt tárolandó.
Száras helyen tartandó.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

DRPG Kft.
2000 Szentendre, Petyina utca 4.

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

4286/1/21 NÉBIH ÁTI (24 x 3 g)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Batch {szám}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

3 g-os fecskendő

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Clamox LC intramammális szuszpenzió tejelő teheneknek A.U.V.
Amoxicillin (trihidrát formájában)
Klavulánsav (kálium-klavulanát formájában)
Prednizolon

2. A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE

Minden 3 g-os fecskendő tartalmaz:
Amoxicillin (trihidrát formájában): 200 mg
Klavulánsav (kálium-klavulanát formájában): 50 mg
Prednizolon: 10 mg

3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA

3 g

4. ALKALMAZÁSI MÓD(OK)

Intramammális alkalmazásra.

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Hús és egyéb ehető szövetek: 7 nap.
Tej: 84 óra.

6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Batch {szám}

7. LEJÁRATI IDŐ

EXP {hónap/év}

8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.