

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR206, šnypščioji tabletė suspensijai ruošti vištoms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje yra:

Veiklioji medžiaga:

gyvo nusilpninto paukščių infekcinio bronchito viruso, 2-06 padermės – ne mažiau kaip $10^{3,2}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,4}$ EID₅₀*

*EID₅₀ – 50 % embrionų infekcinė dozė. (Statistiškai nustatytas viruso kiekis, kuriuo galima tikėtis užkrėsti 50 procentų apvaisintų kiaušinių, kurie juo paskiepyti.)

Pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Trehalozė dihidratas
Natrio – vandenilio karbonatas
Citrinų rūgštis
Magnio stearatas

Apvali balkšva šnypščioji tabletė.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos (broileriai ir būsimos dedeklės).

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Vištoms aktyviai imunizuoti norint sumažinti mirtingumą, klinikinius požymius ir pažeidimus, susijusius su IB viruso 2 varianto padermių sukeliama infekcija.

Imuniteto pradžia: 3 savaitėms po vienkartinės dozės vartojimo 1 dienos amžiaus.

Imuniteto trukmė: iki 35/36 dienų amžiaus.

3.3. Kontraindikacijos

Nėra.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Vakcinavimas šiuo veterinariniu vaistu apsaugo vištas nuo kvėpavimo sistemos simptomų, kuriuos sukelia IBV 2 variantas, ir neturi pakeisti vakcinavimo nuo klasikinio infekcinio bronchito plano.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Vakcinuotos vištos gali išskirti vakcininės padermės mikroorganizmus po vakcinavimo. Vakcininės padermės mikroorganizmai gali išplisti tarp vištų. Reikia atskirti vakcinuotas ir nevakcinuotas vištas. Visos vienos vištidės vištos turi būti vakcinuotos tuo pačiu metu.

Norint išvengti vakcininės padermės mikroorganizmų išplitimo tarp imlių rūšių gyvūnų, reikėtų taikyti atitinkamas veterinarines ir gyvūnų laikymo priemones.

Ši vakcina turi būti naudojama tik nustačius, kad 2 variantas IBV yra epidemiologiškai svarbus. Reikia vengti vakcinos patekimo į vietas, kuriose 2 varianto IBV dar nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – vandeniui nelaidžios pirštinės, kaukė ir apsauginiai akiniai. Po darbo su vakcina darbuotojai turi nusiplauti rankas.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Nėra.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti kartu su vakcina nuo Niukaslo ligos.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu (išskyrus pirmiau minėtas aplinkybes). Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vakciną reikia naudoti purškiant stambiais lašais (inhaliacija) nuo 1-os amžiaus dienos.

Rekomenduojama kartoti vakcinavimą paukščiams sulaukus 10–14 dienų amžiaus.

Dedeklėms gali būti skirti papildomi vakcinavimai.

Dėl vakcinavimo programos visada reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju.

Vakcinavimas purškiant stambiais lašais (inhaliacija). Šis metodas gali būti naudojamas perykloje 1-os dienos amžiaus viščiukams tuo po išsiperėjimo arba ūkyje.

Toliau nurodytas tipinis kiekis, kurį galima naudoti po atskiedimo. Kai kuriais atvejais jį gali reikėti pakoreguoti, laikantis purkštuvo gamintojo nurodymų.

Pateikimas (dozių tabletėje)	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas perykloje	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas vištidėje
500	125–150	100–200
1 000	250–300	200–400
1 500	375–450	300–600
2 000	500–600	400–800
2 500	625–750	500–1 000
3 000	750–900	600–1 200
3 500	875–1 050	700–1 400
4 000	1 000–1 200	800–1 600
4 500	1 125–1 350	900–1 800
5 000	1 250–1 500	1 000–2 000
10 000	2 500–3 000	2 000–4 000

Vakcinavimas perykloje purškiant stambiais lašais (inhaliacija):

Vakcinavimas perykloje paprastai atliekamas automatinio purkštuvu, kuris aktyvinamas dėžėms su viščiukais judant konvejeriu. Kitas purškimo būdas – naudoti rankinį purkštuvą. Abiem atvejais lašeliai turi būti maždaug 100–200 µm (mikrometrų) skersmens ir purškiama taip, kad viščiukai liktų šlapi. 25–30 ml vandens kiekyje turi būti 100 vakcinos dozių ir jo turi pakakti 100 viščiukų.

Veiksmai prieš vakcinuojant perykloje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veikėtų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens – po 250–300 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą praleidžiant pro jį tuščią dėžę, kad įsitikinti, jog lašeliai yra tinkamo dydžio ir vakcina tolygiai padengia dėžę.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes). Paruoštas vaistas yra beveik skaidrus, šiek tiek drumstas tirpalas su plaukiojančiomis labai mažomis dalelėmis ir mažais burbuliukais viršutiniame paviršiuje. Vakcinos negalima vartoti, jei visa tabletė nėra visiškai ištirpusi arba yra visai neištirpusi, taip pat jei tabletė yra netinkamos išvaizdos, pavyzdžiui, pakitusios spalvos arba išbrinkusi.
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštuvo rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.
3. Negalima naudoti pažeistose lizdinės plokštelės dalyse esančių tablečių. Negalima saugoti jokios nepanaudotos vakcinos dalies naudoti kitą dieną. Negalima naudoti per mažos dozės. Perdozuoti yra saugiau, nei naudoti per mažą dozę.

Purškimas

1. Stebėti purkštukų veikimą.
2. Stebėti vandens temperatūrą (10–15 °C).
3. Atskiedus vandeniu vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Stebėjimas

Stebėti vakcinavimo sąlygas tikrinant mėlynus dažus ant viščiukų plunksnų ir ranka juos perbraukiant bei įsitikinant, kad jie visi sušlapo. Apipurkštus viščiukus, kol jie dar šlapi, laikyti uždaroje tinkamai šildomoje patalpoje, kur nėra vėsaus vėjo.

Vakcinavimas ūkyje purškiant stambiais lašais (inhaliacija):

Vakcinavimas ūkyje atliekamas varikliniais arba rankiniais purkštuvais. Šiuo atveju lašeliai taip pat turi būti 100–200 µm (mikrometrų) skersmens. Vakcinai ištirpinti reikiamas vandens kiekis priklauso nuo aparato ir purkštuko.

Veiksmai prieš vakcinuojant ūkyje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktu tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens – po 200–400 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą papurškiant ant švarių grindų.
6. Jeigu purkštukas rankinis, išbandyti ėjimo greitį purkšdami vandenį.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes). Paruoštas vaistas yra beveik skaidrus, šiek tiek drumstas tirpalas su plaukiojančiomis labai mažomis dalelėmis ir mažais burbuliukais viršutiniame paviršiuje. Vakcinos negalima vartoti, jei visa tabletė nėra visiškai ištirpusi arba yra visai neištirpusi, taip pat jei tabletė yra netinkamos išvaizdos, pavyzdžiui, pakitusios spalvos arba išbrinkusi.
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštovo rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.
3. Negalima naudoti pažeistose lizdinės plokštelės dalyse esančių tablečių. Negalima saugoti jokios nepanaudotos vakcinos dalies naudoti kitą dieną. Negalima naudoti per mažos dozės. Perdozuoti yra saugiau, nei naudoti per mažą dozę.

Purškimas

1. Suginti vištas į vieną vištidės pusę.
2. Išjungti vėdinimą.
3. Įjungti visas šviesas.
4. Vakciną purškiantis asmuo turi lėtai vaikščioti palei vištų būrį ir purkšti vakciną 50–100 cm virš jų galvų.
5. Pasirūpinti, kad visi paukščiai būtų padengti vakcinos tirpalu.
6. Praėjus 10–20 minučių po vakcinavimo įjungti vėdinimą.
7. Atskiedus vandeniu vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Purškimui naudojamus įrenginius reikia plauti karštu virintu vandeniu. Prieš vakcinuojant reikia patikrinti purkštovo talpą.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Tyrimais patvirtinta, kad vakcina saugi net perdozavus 10 kartų.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinį ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas:

QI01AD07

Vakcina skatina susidaryti aktyvų imunitetą paukščių infekcinio bronchito virusui. Vakcininės padermės klasifikuojama kaip IB varianto 2-06 vakcininė padermė.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiais kitais veterinariniais vaistais, išskyrus nurodytus 3.8 p.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 18 mėn.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus: 3 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Tabletės (po 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000 dozių) supakuotos į aliuminio lizdines plokšteles: minkštas sidabrinis aliuminis (PVC / PVDC) – sidabrinis aliuminis (PVC).

Kiekvienoje lizdinėje plokštelėje yra 10 tablečių. Kartoninėje dėžutėje yra 1 arba 2 lizdinės plokštelės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Phibro Animal Health (Poland) Sp. z o.o.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/20/2570/001-022

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2020-01-27

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2024-11-28

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**Kartoninė dėžutė****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

TABIC IB VAR206, šnypščioji tabletė suspensijai ruošti

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)Paukščių infekcinio bronchito virusas, 2-06 padermės, $10^{3,2} - 10^{4,4}$ EID₅₀/vienoje dozėje**3. PAKUOTĖS DYDIS**

10 x 500 (1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000) d

20 x 500 (1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000) d

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos (broileriai ir būsimos dedeklės).

**5. INDIKACIJA (-OS)****6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Purškimas stambiais lašais (inhaliacija).

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Ištirpinus sunaudoti per 3 valandas.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti šaldytuve.

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/20/2570/001
LT/2/20/2570/002
LT/2/20/2570/003
LT/2/20/2570/004
LT/2/20/2570/005
LT/2/20/2570/006
LT/2/20/2570/007
LT/2/20/2570/008
LT/2/20/2570/009
LT/2/20/2570/010
LT/2/20/2570/011
LT/2/20/2570/012
LT/2/20/2570/013
LT/2/20/2570/014
LT/2/20/2570/015
LT/2/20/2570/016
LT/2/20/2570/017
LT/2/20/2570/018
LT/2/20/2570/019
LT/2/20/2570/020
LT/2/20/2570/021
LT/2/20/2570/022

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Lizdinės plokštelės arba juostelės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR206

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

IBV, 2-06 padermės, $10^{3,2} - 10^{4,4}$ EID₅₀

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Papildoma informacija:

500 (1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 10 000) d

PhibroTM

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

TAbic IB VAR206, šnypščioji tabletė suspensijai ruošti vištoms.

2. Sudėtis

Vienoje vakcinės dozėje yra:
gyvo nusilpninto paukščių infekcinio bronchito viruso, 2-06 padermės – ne mažiau kaip $10^{3,2}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,4}$ EID₅₀*

*EID₅₀ – 50 % embrionų infekcinė dozė. (Statistiškai nustatytas viruso kiekis, kuriuo galima tikėtis užkrėsti 50 procentų apvaisintų kiaušinių, kurie juo paskiepyti.)

Apvali balkšva šnypščioji tabletė.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos (broileriai ir būsimos dedeklės)

4. Naudojimo indikacijos

Vištoms aktyviai imunizuoti norint sumažinti mirtingumą, klinikinius požymius ir pažeidimus, susijusius su IB viruso 2 varianto padermių sukeliama infekcija.

Imuniteto pradžia: 3 savaitės po vienkartinės dozės vartojimo 1 dienos amžiaus.

Imuniteto trukmė: iki 35/36 dienų amžiaus.

5. Kontraindikacijos

Nėra.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Vakcinavimas šiuo veterinariniu vaistu apsaugo vištas nuo kvėpavimo sistemos simptomų, kuriuos sukelia IBV 2 variantas, ir neturi pakeisti vakcinavimo nuo klasikinio infekcinio bronchito plano.

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams

Vakcinuotos vištos gali išskirti vakcininės padermės mikroorganizmus po vakcinavimo. Vakcininės padermės mikroorganizmai gali išplisti tarp vištų. Todėl reikia atskirti vakcinuotas ir nevakcinuotas vištas. Visos vienos vištėdės vištos turi būti vakcinuotos tuo pačiu metu.

Norint išvengti vakcininės padermės mikroorganizmų išplitimo tarp imlių rūšių gyvūnų, reikėtų taikyti atitinkamas veterinarines ir gyvūnų laikymo priemones.

Ši vakcina turi būti naudojama tik nustačius, kad 2 variantas IBV yra epidemiologiškai svarbus. Reikia vengti vakcinės patekimo į vietas, kuriose 2 varianto IBV dar nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės – vandeniui nelaidžios pirštinės, kaukė ir apsauginiai akiniai. Po darbo su vakcina darbuotojai turi nusiplauti rankas.

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti kartu su vakcinomis nuo Niukaslo ligos.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu (išskyrus pirmiau minėtas aplinkybes). Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Tyrimais patvirtinta, kad vakcina saugi net perdozavus 10 kartų.

Pagrindiniai nesuderinamumai:

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu, išskyrus nurodytus pirmiau.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Nėra.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Vakciną reikia naudoti purškiant stambiais lašais (inhaliacija) nuo 1-os dienos amžiaus.

Rekomenduojama kartoti vakcinavimą paukščiams sulaukus 10–14 dienų amžiaus.

Dedeklėms gali būti skirti papildomi vakcinavimai.

Dėl vakcinavimo programos visada reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Vakcinavimas purškiant stambiais lašais (inhaliacija). Šis metodas gali būti naudojamas perykloje 1-os dienos amžiaus viščiukams tuo po išsiperėjimo arba ūkyje.

Toliau nurodytas tipinis kiekis, kurį galima naudoti po atskiedimo. Kai kuriais atvejais jį gali reikėti pakoreguoti, laikantis purkštuvu gamintojo nurodymų.

Pateikimas (dozių tabletėje)	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas perykloje	Vandens kiekis (ml), kurį reikia naudoti atskiesti - naudojimas vištidėje
500	125–150	100–200
1 000	250–300	200–400
1 500	375–450	300–600
2 000	500–600	400–800
2 500	625–750	500–1 000
3 000	750–900	600–1 200
3 500	875–1 050	700–1 400
4 000	1 000–1 200	800–1 600
4 500	1 125–1 350	900–1 800
5 000	1 250–1 500	1 000–2 000
10 000	2 500–3 000	2 000–4 000

Vakcinavimas perykloje purškiant stambiais lašais (inhaliacija)

Vakcinavimas perykloje paprastai atliekamas automatinio purkštuvu, kuris aktyvinamas dėžėms su viščiukais judant konvejeriu. Kitas purškimo būdas – naudoti rankinį purkštuvą. Abiem atvejais lašeliai turi būti maždaug 100–200 µm (mikrometrų) skersmens ir purškiama taip, kad viščiukai liktų šlapi. 25–30 ml vandens kiekyje turi būti 100 vakcinų dozių ir jo turi pakakti 100 viščiukų.

Veiksmai prieš vakcinuojant perykloje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens – po 250–300 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą praleidžiant pro jį tuščią dėžę, kad įsitikinti, jog lašeliai yra tinkamo dydžio ir vakcina tolygiai padengia dėžę.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes). Paruoštas vaistas yra beveik skaidrus, šiek tiek drumstas tirpalas su plaukiojančiomis labai mažomis dalelėmis ir mažais burbuliukais viršutiniame paviršiuje. Vakcinų negalima vartoti, jei visa tabletė nėra visiškai ištirpusi arba yra visai neištirpusi, taip pat jei tabletė yra netinkamos išvaizdos, pavyzdžiui, pakitusios spalvos arba išbrinkusi.
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštuvu rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.
3. Negalima naudoti pažeistose lizdinės plokštelės dalyse esančių tablečių. Negalima palikti jokios nepanaudotos vakcinų dalies panaudoti kitą dieną. Negalima naudoti per mažos dozės. Perdozuoti yra saugiau, nei duoti per mažą dozę.

Purškimas

1. Stebėti purkštukų veikimą.
2. Stebėti vandens temperatūrą (10–15 °C).
3. Atskiedus vandeniu vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Stebėjimas

Stebėti vakcinavimo sąlygas tikrinant mėlynus dažus ant viščiukų plunksnų ir ranka juos perbraukiant bei įsitikinant, kad jie visi sušlapo. Apipurkštus viščiukus, kol jie dar šlapi, laikyti uždaroje tinkamai šildomoje patalpoje, kur nėra vėsaus vėjo.

Vakcinavimas ūkyje purškiant stambiais lašais (inhaliacija)

Vakcinavimas ūkyje atliekamas varikliniais arba rankiniais purkštuvais. Šiuo atveju lašeliai taip pat turi būti 100–200 µm (mikrometrų) skersmens. Vakcinai ištirpinti reikiamas vandens kiekis priklauso nuo aparato ir purkštuko.

Veiksmai prieš vakcinuojant ūkyje

1. Užtikrinti, kad įranga būtų švari, be dezinfekavimo medžiagų bei ploviklių likučių ir veiktų tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų pakankamai šalto (10–15 °C), prieš tai užvirinto vandentiekio vandens kiekiu – po 200–400 ml kiekvienam 1 000 dozių.
3. Sukalibruoti purkštuvą taip, kad būtų purškiama 100–200 µm (mikrometrų) skersmens lašeliais.
4. Pridėti į vandenį mėlyno dažiklio.
5. Išbandyti purkštuvą papurškiant ant švarių grindų.
6. Jeigu purkštukas rankinis, išbandyti ėjimo greitį purkšdami vandenį.

Pasiruošimas

1. Sudėti pakankamai tablečių į vandens talpyklę ir palaukti, kol jos visiškai ištirps (tai trunka ne ilgiau kaip 5 minutes). Paruoštas vaistas yra beveik skaidrus, šiek tiek drumstas tirpalas su plaukiojančiomis labai mažomis dalelėmis ir mažais burbuliukais viršutiniame paviršiuje. Vakcinos negalima vartoti, jei visa tabletė nėra visiškai ištirpusi arba yra visai neištirpusi, taip pat jei tabletė yra netinkamos išvaizdos, pavyzdžiui, pakitusios spalvos arba išbrinkusi.
2. Supilti ištirpintą vakciną į purkštuvo rezervuarą ir atsargiai sumaišyti.
3. Negalima naudoti pažeistose lizdinės plokštelės dalyse esančių tablečių. Negalima palikti jokios nepanaudotos vakcinos dalies panaudoti kitą dieną. Negalima naudoti per mažos dozės. Perdozuoti yra saugiau, nei duoti per mažą dozę.

Purškimas

1. Suginti vištas į vieną vištidės pusę.
2. Išjungti vėdinimą.
3. Įjungti visas šviesas.
4. Vakciną purškiantis asmuo turi lėtai vaikščioti palei vištų būrį ir purkšti vakciną 50–100 cm virš jų galvų.
5. Pasirūpinti, kad visi paukščiai būtų padengti vakcinos tirpalu.
6. Praėjus 10–20 minučių po vakcinavimo įjungti vėdinimą.
7. Atskiedus vandeniu vakcina išlieka visiškai aktyvi 3 valandų laikotarpį, tačiau geriausia ją panaudoti nedelsiant po atskiedimo.

Purškimui naudojamus įrenginius reikia plauti karštu virintu vandeniu. Prieš vakcinuojant reikia patikrinti purkštuvo talpą.

10. Išlauka

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Exp.“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus – 3 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

Tabletės (po 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 arba 10 000 dozių) supakuotos į aliuminio lizdines plokšteles: minkštas sidabrinis aliuminis (PVC / PVDC) – sidabrinis aliuminis (PVC). Kiekvienoje lizdinėje plokštelėje yra 10 tablečių. Kartoninėje dėžutėje yra 1 arba 2 lizdinės plokštelės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2024-11-28

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

Phibro Animal Health (Poland) Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Lenkija
El. paštas: pv.polska@pahc.com
Tel.: +48 607 380 360

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 15
62-020 Swarzędz
Lenkija

17. Kita informacija

Vakcina skatina susidaryti aktyvų imunitetą paukščių infekcinio bronchito virusui. Vakcininės padermė klasifikuojama kaip IB varianto 2-06 vakcininė padermė. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.