

BIPACKSEDEL

Lidcosal Vet 16,2 mg/ml laryngofaryngeal spray, lösning för katter

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:

Genera Inc.
Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Kroatie

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Lidcosal Vet 16,2 mg/ml laryngofaryngeal spray, lösning för katter
Lidokain

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:
Lidokainhydrokloridmonohydrat 20 mg/ml
(motsvarande 16,2 mg/ml lidokain)

Hjälpämnen:
Klorkresol 1 mg/ml

Klar, färglös vätska.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lokalanestesi av kattens laryngeala slemhinna med syfte att underlätta endotrakeal intubering genom att förhindra stimulering av den laryngeala reflexen.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte på djur som har låg blodvolym (hypovolemi) eller som har hjärtblock. Använd inte vid kända fall av överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För laryngofaryngeal användning.

Spraya en eller två gånger bak i halsen. Varje pumpning (0,14 ml) innehåller ca 2,8 mg lidokainhydrokloridmonohydrat, vilket motsvarar 2,27 mg lidokain. Vänta i 30-90 sekunder innan intuberingen påbörjas, så att larynx slappnat av.

När munstycket tas av spraypumpen måste det lyftas av vertikalt och inte i vinkel, så att stiftet inte skadas.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Pumpa innan användning tills vätska kommer ut. Minst 4 pumpningar rekommenderas för att få i gång flaskan före första användningen, och minst 2 pumpningar rekommenderas om flaskan inte har använts på 7 dagar eller längre.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen, efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inom 3 månader efter öppnandet.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Använd med försiktighet vid lever- eller hjärtsvikt.

Kallsterilisering av munstycket rekommenderas mellan användningarna, för att undvika spridning av infektion.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

- Lidokain och klorkresol kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska). Personer med känd överkänslighet mot dessa ämnen bör undvika kontakt med läkemedlet.
- Oavsiktlig exponering av detta läkemedel kan leda till lokala effekter, som domningar, och systemiska effekter, som yrsel eller dåsigheit. Undvik oavsiktlig exponering, i synnerhet oralt, i ögonen eller via inhalering.
- Bär handskar när du hanterar läkemedlet och tvätta exponerade områden efter användning. Vid oavsiktlig exponering i ögonen, skölj med vatten.
- Vid allvarliga eller långvariga reaktioner, sök läkarvård och visa denna information eller etiketten för läkaren.
- Lidokain kan bilda DNA-skadande (genotoxiska) och mutationsframkallande (mutagena) ämnesomsättningsprodukter (metaboliter) hos människor. Vid långtidsstudier inom läran om gifter (toxikologi) på råttor kan dessa ämnesomsättningsprodukter i höga doser också ge cancerframkallande (karcinogena) effekter.

Dräktighet och digivning:

Laboratoriestudier på möss har visat evidens för fosterskadande (fetotoxiska) effekter i höga doser. Inga säkerhetsstudier har utförts av läkemedlet på dräktiga honkatter.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-/riskbedömning.

Andra läkemedel och Lidcosal Vet:

Inga kända.

Blandbarhetsproblem:

Ej relevant.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2021-12-01

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För djur.

Receptbelagt.

Förpackningskvantitet: 10 ml.