

**ANEXO I**

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

## 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

YURVAC RHD emulsão injetável para coelhos

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada dose de 0,5 ml contém:

### Substância ativa:

Proteína da cápside viral RHDV2 recombinante                      RP\*  $\geq$  0,7

\* Potência relativa (teste ELISA)

### Adjuvante:

Óleo mineral leve    104,125 mg

### Excipientes:

Composição qualitativa dos excipientes e outros componentes	Composição quantitativa, se esta informação for essencial para a administração adequada do medicamento veterinário
Polissorbato 80	0,03 g
Mono-oleato de sorbitano	
Cloreto de sódio	
Cloreto de potássio	
Fosfato dissódico dodeca-hidratado	
Fosfato de potássio di-hidrogenado	
Água para preparações injetáveis	

Emulsão homogénea branca.

## 3. INFORMAÇÃO CLÍNICA

### 3.1 Espécies-alvo

Coelhos, incluindo coelhos de estimação (anões).

### 3.2 Indicações de utilização para cada espécie-alvo

Para a imunização ativa de coelhos a partir dos 30 dias de idade a fim de reduzir a mortalidade da doença hemorrágica viral do coelho (RHD) causada pelo vírus da RHD clássica (RHDV) e por estirpes variantes (RHDV2), incluindo estirpes altamente virulentas.

Início da imunidade:        7 dias para RHDV2.  
                                      14 dias para RHDV.

Duração da imunidade: 1 ano

### 3.3 Contraindicações

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa, ao adjuvante ou a algum dos excipientes.

### 3.4 Advertências especiais

Vacinar apenas animais saudáveis.

### 3.5 Precauções especiais de utilização

#### Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo:

As coelhas gestantes devem ser manuseadas cuidadosamente para evitar o stress e o risco de aborto. Não foi realizado nenhum estudo de segurança sobre o desempenho reprodutivo em coelhos machos.

#### Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

##### Aviso ao utilizador:

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental ou a autoinjeção pode provocar dor intensa e tumefação, em particular se injetado numa articulação ou dedo, podendo, em casos raros, resultar na perda do dedo afetado, caso não sejam prestados cuidados médicos imediatos. Em caso de injeção acidental com este medicamento veterinário, e ainda que a quantidade injetada seja mínima, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o folheto informativo do medicamento veterinário. Se as dores persistirem por mais de 12 horas após o exame médico, consulte novamente o médico.

##### Aviso ao médico:

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental, ainda que numa quantidade mínima, pode provocar tumefação intensa que pode resultar, por exemplo, em necrose isquémica e, caso a zona afetada seja um dedo, na perda deste. É necessário prestar **IMEDIATAMENTE** cuidados cirúrgicos, podendo ser necessário proceder à incisão precoce e à irrigação da zona injetada, em especial se esta envolver os tecidos moles ou o tendão de um dedo.

#### Precauções especiais para a proteção do ambiente:

Não aplicável.

### 3.6 Eventos adversos

Coelhos, incluindo coelhos de estimação (anões).

Muito frequentes (>1 animal / 10 animais tratados):	Temperatura elevada <sup>1</sup> Inflamação no local da injeção <sup>2</sup>
--	---

<sup>1</sup> O maior aumento de temperatura retal individual foi de 1,15 °C, que voltou aos valores normais 24 horas depois.

<sup>2</sup> Pode observar-se inflamação (< 2 cm) no local da injeção. Estas reações locais diminuem e desaparecem gradualmente sem necessidade de tratamento.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um médico veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou ao respetivo representante local ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Consulte o folheto informativo sobre os respetivos dados de contacto.

### 3.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

#### Gestação e lactação:

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

### **3.8 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação**

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

### **3.9 Posologia e via de administração**

Via subcutânea.

Vacinação primária:

Administrar uma dose (0,5 ml) por via subcutânea a coelhos a partir dos 30 dias de idade.

Revacinação:

Revacinar anualmente com uma dose (0,5 ml) por injeção subcutânea.

Deixar a vacina atingir a temperatura ambiente antes de utilizar.

Agitar bem antes da administração.

### **3.10 Sintomas de sobredosagem (e, quando aplicável, procedimentos de emergência e antídotos)**

Não foram observadas reações adversas além das mencionadas na secção 3.6 após a administração de uma dose quintuplicada.

### **3.11 Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização, incluindo restrições à utilização de medicamentos veterinários antimicrobianos e antiparasitários, a fim de limitar o risco de desenvolvimento de resistência**

Não aplicável.

### **3.12 Intervalos de segurança**

Zero dias.

## **4. PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS**

### **4.1 Código ATCvet:**

Código ATCvet: QI08AV.

A vacina é indicada para estimular a imunidade ativa contra o RHDV e contra o RHDV2.

A substância ativa da vacina é a proteína recombinante do capsídeo RHDV2, auto-montado em Partículas Semelhantes a Vírus (VLPs).

## **5. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS**

### **5.1 Incompatibilidades principais**

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário.

## **5.2 Prazo de validade**

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 1 ano.  
Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 10 horas.

## **5.3 Precauções especiais de conservação**

Conservar e transportar refrigerado (2 °C – 8 °C).

Não congelar.

Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz.

## **5.4 Natureza e composição do acondicionamento primário**

Frascos para injetáveis de vidro incolor Tipo I com 0,5 ml (1 dose) e 5 ml (10 doses).  
Os frascos para injetáveis são fechados com uma rolha de borracha e uma cápsula de fecho de alumínio.

Frascos PET Tipo I incolores com 20 ml (40 doses) e 100 ml (200 doses).

Os frascos para injetáveis são fechados com uma rolha de borracha e uma cápsula de fecho de alumínio.

### Apresentações:

Caixa de cartão com 10 frascos para injetáveis de vidro de 1 dose (0,5 ml).

Caixa de cartão com 1 frasco para injetáveis de vidro de 10 doses (5 ml).

Caixa de cartão com 1 frasco para injetáveis PET de 40 doses (20 ml).

Caixa de cartão com 1 frasco para injetáveis PET de 200 doses (100 ml).

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

## **5.5 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis ao medicamento veterinário em causa.

## **6. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

## **7. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/2/23/298/001

EU/2/23/298/002

EU/2/23/298/003

EU/2/23/298/004

## **8. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO**

Data da primeira autorização: 11/09/2023

**9. DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DO RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

**10. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **ANEXO II**

### **OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Não existentes.

**ANEXO III**  
**ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO**



## **A. ROTULAGEM**

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO****CAIXA DE CARTÃO****1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

YURVAC RHD emulsão injetável para coelhos

**2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

Cada dose de 0,5 ml contém:

Proteína da cápside viral RHDV2 recombinante                      RP\*  $\geq$  0,7

\* Potência relativa (teste ELISA)

**3. DIMENSÃO DA EMBALAGEM**

10 x 1 dose (0,5 ml).

10 doses (5 ml).

40 doses (20 ml).

200 doses (100 ml).

**4. ESPÉCIES-ALVO**

Coelhos, incluindo coelhos de estimação (anões).

**5. INDICAÇÕES****6. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO**

Via subcutânea.

**7. INTERVALOS DE SEGURANÇA**

Intervalo de segurança: Zero dias.

**8. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {mm/aaaa}

Após a primeira abertura da embalagem, administrar no prazo de 10 horas.

**9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

Armazenar e transportar refrigerado.

Não congelar.

Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz.

**10. MENÇÃO "Antes de administrar, ler o folheto informativo"**

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

**11. MENÇÃO "USO VETERINÁRIO"**

USO VETERINÁRIO

**12. MENÇÃO "MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**13. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**14. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/2/23/298/001 (1 dose)

EU/2/23/298/002 (10 doses)

EU/2/23/298/003 (40 doses)

EU/2/23/298/004 (200 doses)

**15. NÚMERO DO LOTE**

Lot {número}

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO****FRASCO DE 200 DOSES.****1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

YURVAC RHD emulsão injetável para coelhos

**2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

Cada dose de 0,5 ml contém:

Proteína da cápside viral RHDV2 recombinante                       $RP^* \geq 0,7$   
\* Potência relativa (teste ELISA)**3. ESPÉCIES-ALVO**

Coelhos, incluindo coelhos de estimação (anões).

**4. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO**Via subcutânea.  
Antes de administrar, ler o folheto informativo.**5. INTERVALOS DE SEGURANÇA**

Intervalo de segurança: Zero dias.

**6. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {mm/aaaa}

Após a primeira abertura da embalagem, administrar no prazo de 10 horas.

**7. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**Armazenar e transportar refrigerado.  
Não congelar.  
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz.**8. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**9. NÚMERO DO LOTE**

Lot {número}

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE  
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO**

**FRASCO DE 1 DOSE, 10 DOSES E 40 DOSES.**

**1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

YURVAC RHD emulsão injetável para coelhos

**2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

Cada dose de 0,5 ml contém:

Proteína da cápside viral RHDV2 recombinante                       $RP^* \geq 0,7$

\* Potência relativa (teste ELISA)

**3. NÚMERO DO LOTE**

Lot {número}

**4. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {mm/aaaa}

Após a primeira abertura da embalagem, administrar no prazo de 10 horas.

## **B. FOLHETO INFORMATIVO**

## FOLHETO INFORMATIVO

### 1. Nome do medicamento veterinário

YURVAC RHD emulsão injetável para coelhos

### 2. Composição

Cada dose de 0,5 ml contém:

**Substância ativa:** Proteína da cápside viral RHDV2 recombinante      RP\*  $\geq 0,7$   
\* Potência relativa (teste ELISA)

**Adjuvante:** Óleo mineral leve      104,125 mg

Emulsão homogénea branca.

### 3. Espécies-alvo

Coelhos, incluindo coelhos de estimação (anões).

### 4. Indicações de utilização

Para a imunização ativa de coelhos a partir dos 30 dias de idade a fim de reduzir a mortalidade da doença hemorrágica viral do coelho (RHD) causada pelo vírus da RHD clássica (RHDV) e por estirpes variantes (RHDV2), incluindo estirpes altamente virulentas.

Início da imunidade:      7 dias para RHDV2.  
   14 dias para RHDV.

Duração da imunidade: 1 ano.

### 5. Contraindicações

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa, ao adjuvante ou a algum dos excipientes.

### 6. Advertências especiais

Advertências especiais:

Vacinar apenas animais saudáveis.

Precauções especiais para uma utilização segura nas espécies-alvo:

As coelhas gestantes devem ser manuseadas cuidadosamente para evitar o stress e o risco de aborto.

Não foi realizado nenhum estudo de segurança sobre o desempenho reprodutivo em coelhos machos.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Aviso ao utilizador:

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental ou a autoinjeção pode provocar dor intensa e tumefação, em particular se injetado numa articulação ou dedo, podendo, em



casos raros, resultar na perda do dedo afetado, caso não sejam prestados cuidados médicos imediatos. Em caso de injeção acidental com este medicamento veterinário, e ainda que a quantidade injetada seja mínima, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o folheto informativo do medicamento veterinário. Se as dores persistirem por mais de 12 horas após o exame médico, consulte novamente o médico.

**Aviso ao médico:**

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental, ainda que numa quantidade mínima, pode provocar tumefação intensa que pode resultar, por exemplo, em necrose isquémica e, caso a zona afetada seja um dedo, na perda deste. É necessário prestar **IMEDIATAMENTE** cuidados cirúrgicos, podendo ser necessário proceder à incisão precoce e à irrigação da zona injetada, em especial se esta envolver os tecidos moles ou o tendão de um dedo.

**Precauções especiais para a proteção do ambiente:**

Não aplicável.

**Gestação e lactação:**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

**Interação com outros medicamentos e outras formas de interação:**

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

**Sobredosagem:**

Não foram observadas reações adversas além das mencionadas na secção “Eventos adversos” 3.6 após a administração de uma dose quintuplicada.

**Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização:**

Não aplicável.

**Incompatibilidades principais:**

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário.

## **7. Eventos adversos**

Coelhos, incluindo coelhos de estimação (anões):

Muito frequentes (>1 animal / 10 animais tratados):	Temperatura elevada <sup>1</sup> Inflamação no local da injeção <sup>2</sup>
--	---

<sup>1</sup> O maior aumento de temperatura retal individual foi de 1,15 °C, que voltou aos valores normais 24 horas depois.

<sup>2</sup> Pode observar-se inflamação (< 2 cm) no local da injeção. Estas reações locais diminuem e desaparecem gradualmente sem necessidade de tratamento.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário. Também pode comunicar quaisquer eventos adversos ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou ao representante local do Titular da Autorização de Introdução no Mercado utilizando os dados de contacto no final deste folheto, ou através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária (SNFV): {detalhes do sistema nacional}.

## **8. Dosagem em função da espécie, via e modo de administração**

Via subcutânea.

Vacinação primária:

Administrar uma dose (0,5 ml) por via subcutânea a coelhos a partir dos 30 dias de idade.

Revacinação:

Revacinar anualmente com uma dose (0,5 ml) por injeção subcutânea.

## **9. Instruções com vista a uma administração correta**

Deixar a vacina atingir a temperatura ambiente antes de utilizar.

Agitar bem antes de utilizar.

## **10. Intervalos de segurança**

Zero dias.

## **11. Precauções especiais de conservação**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar e transportar refrigerado (2 °C – 8 °C).

Não congelar.

Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz.

Não administrar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo e na embalagem exterior, depois de VAL.

Prazo de validade após a primeira abertura da acondicionamento primário: 10 horas.

## **12. Precauções especiais de eliminação**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de retoma de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente.

Pergunte ao seu médico-veterinário ou farmacêutico como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são necessários.

## **13. Classificação dos medicamentos veterinários**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

## **14. Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem**

EU/2/23/298/001-004

Tamanhos de embalagem:

Caixa de cartão com 10 frascos para injetáveis de vidro de 1 dose (0,5 ml).

Caixa de cartão com 1 frasco para injetáveis vidro de 10 doses (5 ml).

Caixa de cartão com 1 frasco para injetáveis PET de 40 doses (20 ml).

Caixa de cartão com 1 frasco para injetáveis PET de 200 doses (100 ml).

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

**15. Data em que o folheto informativo foi revisto pela última vez**

{MM/AAAA}

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Detalhes de contacto**

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e fabricante responsável pela libertação do lote e detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. La Selva, 135  
17170 Amer (Girona) ESPANHA  
Tel: +34 972 43 06 60

Representantes locais e detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos :

Para quaisquer informações sobre este medicamento veterinário, contacte o representante local do titular da Autorização de Introdução no Mercado.

<b>België/Belgique/Belgien</b> HIPRA BENELUX NV Nieuwewandeling 62 9000 Gent BELGIUM Tel: +32 09 2964464	<b>Lietuva</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer (Girona) ISPANIJA Tel: +34 972 43 06 60
<b>Република България</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ Тел: +34 972 43 06 60	<b>Luxembourg/Luxemburg</b> HIPRA BENELUX NV Nieuwewandeling 62 9000 Gent BELGIUM Tel: +32 09 2964464
<b>Česká republika</b> HIPRA SLOVENSKO, s.r.o. Zochova 5, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO Tel: +421 02 32 335 223	<b>Magyarország</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer (Girona) SPANYOLORSZÁG Tel: +34 972 43 06 60

<p><b>Danmark</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPANIEN  Tel: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Malta</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPANJA  Tel: +34 972 43 06 60</p>
<p><b>Deutschland</b>  HIPRA DEUTSCHLAND GmbH  Am Wehrhahn 28-30  40211 Düsseldorf  DEUTSCHLAND  Tel: +49 211 698236 – 0</p>	<p><b>Nederland</b>  HIPRA BENELUX NV  Nieuwewandeling 62  9000 Gent  BELGIUM  Tel: +32 09 2964464</p>
<p><b>Eesti</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  HISPAANIA  Tel: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Norge</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPANIA  Tlf: +34 972 43 06 60</p>
<p><b>Ελλάδα</b>  HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Λεωφ. Αθηνών 80 &amp; Μηριόνου 2-4,  104 41 Κολωνός - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ  Τηλ: +30 210 4978660</p>	<p><b>Österreich</b>  HIPRA DEUTSCHLAND GmbH  Am Wehrhahn 28-30  40211 Düsseldorf  DEUTSCHLAND  Tel: +49 211 698236 – 0</p>
<p><b>España</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  ESPAÑA  Tel: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Polska</b>  HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.  Ul. Wincentego Rzymowskiego 31  02-697 Warszawa - POLSKA  Tel: +48 22 642 33 06</p>
<p><b>France</b>  HIPRA FRANCE  7 rue Roland Garros, Batiment H  44700 - Orvault -  FRANCE  Tél: +33 02 51 80 77 91</p>	<p><b>Portugal</b>  ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários  De Uso Animal, Lda  Portela de Maфра e Fontaínha - Abrunheira  2665 – 191 Malveira - PORTUGAL  Tel:+351 219 663 450</p>
<p><b>Hrvatska</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  ŠPANJOLSKA  Tel: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>România</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPANIA  Tel: +34 972 43 06 60</p>

<p><b>Ireland</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPAIN  Tel: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Slovenija</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  ŠPANIJA  Tel: +34 972 43 06 60</p>
<p><b>Ísland</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPÁNN  Sími: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Slovenská republika</b>  HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.  Zochova 5,  811 03 Bratislava,  SLOVENSKO  Tel: +421 02 32 335 223</p>
<p><b>Italia</b>  Hipra Italia S.r.l.  Enrico Mattei, 2  25030 Coccaglio (BS)  ITALIA  Tel: +39 030 7241821</p>	<p><b>Suomi/Finland</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  ESPANJA  Puh/Tel: +34 972 43 06 60</p>
<p><b>Κύπρος</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  ΙΣΠΑΝΙΑ  Τηλ: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Sverige</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPANIEN  Tel: +34 972 43 06 60</p>
<p><b>Latvija</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPĀNIJA  Tel: +34 972 43 06 60</p>	<p><b>Portugal</b>  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Avda. La Selva, 135  17170 Amer (Girona)  SPAIN  Tel: +34 972 43 06 60</p>