RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VETRIMOXIN, 20 mg/ml, pasta per uso orale per cani e gatti.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 ml di prodotto contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 20 mg presente come amoxicillina triidrato.

Eccipienti

Butilidrossitoluene 0,1 mg;

Butilidrossianisolo 0,2 mg.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

1 siringa da 15 ml contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 300 mg presente come amoxicillina triidrato.

Eccipienti:

Butilidrossitoluene 1,5 mg;

Butilidrossianisolo 3,0 mg.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Pasta per uso orale.

La pasta è contenuta in una siringa dosatrice da 15 ml.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti.

4.2 Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione

Cani e gatti: infezioni batteriche causate da batteri sensibili all'amoxicillina, in particolare:

- infezioni dell'apparato respiratorio (riniti, laringiti, tonsilliti, bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti);
- infezioni dell'apparato gastrointestinale (gastroenteriti, enteriti batteriche);
- infezioni dell'apparato urogenitale (cistiti, sindrome FLUTD - Feline Lower Urinary Tract

Disease-, uretriti, pieliti, vaginiti, metriti, piometre);

- infezioni cutanee (piodermi, ferite infette, infezioni podali);
- infezioni batteriche secondarie a malattie virali

causate da:

Germi Gram positivi: *Clostridia* spp., *Corinebacteria* spp., *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus* spp. (penicillino-sensibili), *Streptococcus* spp..

Germi Gram negativi: *Brucellae* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Klebsiellae* spp., *Leptospira* spp., *Moraxella* spp., *Neisseria* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.,

Altri: *Actinomyces* spp., *Actinobacillus* spp..

4.3 Controindicazioni

Non somministrare a:

- animali con ipersensibilità nota alle penicilline cefalosporine ad altri farmaci betalattamici o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- conigli, cavie, criceti, gerbilli e piccoli roditori in genere e a poligastrici con ruminante funzionante: in tali specie tutte le penicilline possono determinare gravi enterocoliti.

Non somministrare nei casi di accertata insufficienza renale. L'uso del prodotto è controindicato dove sono noti casi di resistenza alle penicilline.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'uso della amoxicillina nelle infezioni sostenute da stafilococchi dovrebbe essere preceduta da una accurata indagine in quanto tali germi potrebbero aver sviluppato resistenza all'antibiotico.

In animali affetti da insufficienza renale o epatica la posologia deve essere valutata con cura.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le penicilline possono causare reazioni da ipersensibilità a seguito di ingestione o contatto con la pelle. Tali reazioni possono essere occasionalmente molto serie. Si può sviluppare ipersensibilità crociata tra penicilline e cefalosporine e viceversa.

Le persone con nota ipersensibilità all'amoxicillina o ad altre penicilline o a cefalosporine devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Fare attenzione durante la somministrazione del prodotto.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

L'amoxicillina ha dimostrato sicurezza di impiego. Raramente possono essere osservati disturbi digestivi (vomito, dispepsia) a carattere lieve e transitorio; di norma non è necessario sospendere il trattamento.

Reazioni di ipersensibilità non legate al dosaggio possono comparire con tali prodotti.

4.7 Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Il prodotto può essere usato in gravidanza e allattamento in seguito a valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del medico veterinario.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

La somministrazione contemporanea di amoxicillina con antibiotici ad azione batteriostatica, quali tetracicline e macrolidi, deve essere evitata in quanto viene ridotta l'attività antibatterica dell'amoxicillina.

È noto l'effetto sinergico tra Penicilline semi-sintetiche ed Aminoglicosidi pertanto è bene evitare l'associazione con altri farmaci nefrotossici o altri antibiotici nefrotossici (aminoglicosidi).

4.9 Posologia e via di somministrazione

Uso orale.

Vetrimoxin pasta deve essere somministrata per via orale direttamente nelle fauci dell'animale inserendo il beccuccio della siringa dosatrice tra le mascelle. In caso di animali difficili può essere mischiato al cibo. Per i gatti si può applicare la pasta direttamente sulla zampa anteriore in modo che venga leccata spontaneamente dall'animale.

L'appetibilità della pasta ne facilita l'assunzione.

Vetrimoxin pasta si somministra due volte al giorno alla posologia di 0,5 ml per kg di peso vivo, corrispondente a 10 mg/kg di amoxicillina/2 volte al dì.

Schema di trattamento in funzione del peso dell'animale:

da 1,5 a 2,5 kg:	1 ml due volte al giorno
da 2,6 a 5 kg :	2 ml due volte al giorno
da 5,1 a 7 kg :	3 ml due volte al giorno
da 7,1 a 9 kg :	4 ml due volte al giorno
da 9,1 a 11 kg :	5 ml due volte al giorno

(1 ml = 1 cc di pasta)

Il trattamento va continuato per 5 giorni. Le modalità ed il periodo di trattamento possono essere adattate al singolo caso clinico a giudizio del Medico Veterinario.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

Non superare la posologia prescritta.

4.11 Tempi di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: antibatterici per uso sistemico – penicilline ad ampio spettro-amoxicillina.

ATCvet code: QJ01CA04.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

L'amoxicillina è una penicillina semi-sintetica a largo spettro d'azione ed è il para-idrossi analogo dell'ampicillina.

Meccanismo d'azione:

Il meccanismo d'azione dell'amoxicillina è identico a quello delle altre penicilline, antibiotici battericidi che inibiscono la sintesi dei peptidoglicani essenziali per la formazione della parete cellulare dei germi rendendola più fragile e, quindi, incapace di sopportare la pressione osmotica endocellulare e, pertanto, soggetta a lisi.

Spettro d'azione:

Germi Gram positivi: *Clostridia* spp., *Corinebacteria* spp., *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus* spp. (penicillino-sensibili), *Streptococcus* spp..

Germi Gram negativi: *Brucellae* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Klebsiellae* spp., *Leptospira* spp., *Moraxella* spp., *Neisseria* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.,

Altri: *Actinomyces* spp., *Actinobacillus* spp..

I dati di M.I.C. disponibili sono i seguenti:

<i>Streptococcus</i> spp.:	M.I.C.: 0.1 µg/mL
<i>Haemophilus</i> :	M.I.C.: ≤1 µg/mL
<i>Moraxella</i> :	M.I.C.: ≤1 µg/mL
<i>Pasteurella</i> :	M.I.C.: ≤1 µg/mL
<i>Proteus</i> spp.:	M.I.C.: tra 2 e 4 µg/mL
<i>Salmonella</i> spp.:	M.I.C.: tra 2 e 4 µg/mL
<i>Escherichia coli</i> :	M.I.C.: tra 2 e 4 µg/mL
<i>Actinobacillus</i> spp.:	M.I.C.: ≤1 µg/mL

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Dopo somministrazione orale l'amoxicillina è ben assorbita; il cibo non influenza l'assorbimento. Le concentrazioni massime plasmatiche (Cmax) di circa 6.50 mcg/ml si rilevano entro 1.89 ore (Tmax) dopo il trattamento.

I tempi di persistenza sopra i valori limite di M.I.C. (T<0,25 e 0,50 mcg/ml) sono da 7 a 9 ore, i.e. dal 60% all'80% dell'intervallo tra due somministrazioni.

La bassa quota di legame proteico, inoltre, favorisce la sua diffusione nei tessuti. Le concentrazioni tissutali sono state misurate a livello espectorato bronchiale, nel tratto respiratorio, negli spazi interstiziali, nel liquido cerebrospinale, nei reni, nelle urine, nel fegato, nella bile e, nelle femmine gravide, nei tessuti fetali, nel sangue ombelicale e nel liquido amniotico.

Le biotrasformazioni sono poco significative; l'idrolisi dell'anello β-lattamico produce acido penicilloidi inattivi. Circa il 20% della quantità somministrata per via orale viene ritrovata sotto questa forma nelle urine.

L'eliminazione avviene per lo più attraverso filtrazione renale (dal 50 all'80% della quantità somministrata per via orale) e secondariamente attraverso la secrezione attiva tubulare. L'eliminazione per via biliare rappresenta una via di escrezione minore.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

butilidrossitoluene
butilidrossianisolo
silice colloidale anidra
miscela di trigliceridi C₈C₁₀
sapore di carne
trigliceridi C₈C₁₀ 65/35

6.2 Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.
Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 12 giorni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Mantenere il prodotto in confezionamento integro a temperatura non superiore a 25°C.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Natura del condizionamento primario:
1 siringa dosatrice di politene alta densità contenente 15 ml di pasta, in astuccio di cartone.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo, se pertinente

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Ceva Salute Animale S.p.A.
Via dei Valtorta 48
20127 Milano.

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Siringa da 15 ml di pasta orale A.I.C. 102217027

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data di prima autorizzazione: 19 aprile 1996.
Data del rinnovo: 19 aprile 2011.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

09/2023

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Siringa da 15 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VETRIMOXIN, 20 mg/ml, pasta per uso orale per cani e gatti
amoxicillina

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 siringa da 15 ml contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 300 mg presente come amoxicillina triidrato.

Eccipienti: butilidrossitoluene, butilidrossianisolo.

3. FORMA FARMACEUTICA

Pasta per uso orale.

4. CONFEZIONE

Siringa da 15 ml di pasta orale

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD: (mese/anno)

Dopo apertura, da usare entro 12 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Mantenere il prodotto in confezionamento integro a temperatura non superiore a 25°C.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO LOTTI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A.

Via dei Valtorta 48

20127 Milano.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello, 8, 92014 Porto Empedocle (AG).

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. 102217027

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto: (numero)

Sarà previsto lo spazio per codice a barre a lettura ottica DM 17/12/2007.

POSOLOGIA:

N. GTIN 03411110042717

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO

Siringa da 15 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VETRIMOXIN, 20 mg/ml, pasta per uso orale per cani e gatti
amoxicillina

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 siringa da 15 ml contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 300 mg presente come amoxicillina triidrato.

Eccipienti: butilidrossitoluene, butilidrossianisolo.

3. FORMA FARMACEUTICA

Pasta per uso orale.

4. CONFEZIONI

Siringa da 15 ml di pasta orale

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD: (mese/anno)

Dopo apertura, da usare entro 12 giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Mantenere il prodotto in confezionamento integro a temperatura non superiore a 25°C.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO E FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO LOTTI

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A.

Via dei Valtorta 48

20127 Milano.

Titolare dell’autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello, 8, 92014 Porto Empedocle (AG).

16. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. 102217027

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lot: (numero)

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

VETRIMOXIN, 20 mg/ml, pasta per uso orale per cani e gatti
amoxicillina

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A., Via dei Valtorta 48, 20127 Milano.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello, 8, 92014 Porto Empedocle (AG).

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VETRIMOXIN, 20 mg/ml, pasta per uso orale per cani e gatti
amoxicillina

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 ml di prodotto contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 20 mg presente come amoxicillina triidrato.

Eccipienti

Butilidrossitoluene,
Butilidrossianisolo.

1 siringa da 15 ml contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 300 mg presente come amoxicillina triidrato.

Eccipienti:

Butilidrossitoluene,
Butilidrossianisolo.

4. INDICAZIONI

Cani e gatti: infezioni batteriche causate da batteri sensibili all'amoxicillina, in particolare:

- infezioni dell'apparato respiratorio (riniti, laringiti, tonsilliti, bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti);
- infezioni dell'apparato gastrointestinale (gastroenteriti, enteriti batteriche);
- infezioni dell'apparato urogenitale (cistiti, sindrome FLUTD - Feline Lower Urinary Tract Disease-, uretriti, pieliti, vaginiti, metriti, piometre);
- infezioni cutanee (piodermi, ferite infette, infezioni podali);
- infezioni batteriche secondarie a malattie virali causate da:

Germi Gram positivi: *Clostridia* spp., *Corinebacteria* spp., *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus* spp. (penicillino-sensibili), *Streptococcus* spp..

Germi Gram negativi: *Brucellae* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Klebsiellae* spp., *Leptospira* spp., *Moraxella* spp., *Neisseria* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.,

Altri: *Actinomyces* spp., *Actinobacillus* spp..

5. CONTROINDICAZIONI

Non somministrare a:

- animali con ipersensibilità nota alle penicilline cefalosporine ad altri farmaci betalattamici o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- conigli, cavie, criceti, gerbilli e piccoli roditori in genere e a poligastrici con rumine funzionante: in tali specie tutte le penicilline possono determinare gravi enterocoliti.

Non somministrare nei casi di accertata insufficienza renale. L'uso del prodotto è controindicato dove sono noti casi di resistenza alle penicilline.

6. REAZIONI AVVERSE

L'amoxicillina ha dimostrato sicurezza di impiego. Raramente possono essere osservati disturbi digestivi (vomito, dispepsia) a carattere lieve e transitorio; di norma non è necessario sospendere il trattamento.

Reazioni di ipersensibilità non legate al dosaggio possono comparire con tali prodotti.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale.

Vetrimoxin pasta deve essere somministrata per via orale direttamente nelle fauci dell'animale inserendo il beccuccio della siringa dosatrice tra le mascelle. In caso di animali difficili può essere mischiato al cibo. Per i gatti si può applicare la pasta direttamente sulla zampa anteriore in modo che venga leccata spontaneamente dall'animale.

L'appetibilità della pasta ne facilita l'assunzione.

Vetrimoxin pasta si somministra due volte al giorno alla posologia di 0,5 ml per kg di peso vivo, corrispondente a 10 mg/kg di amoxicillina/2 volte al dì.

Schema di trattamento in funzione del peso dell'animale:

da 1,5 a 2,5 kg : 1 ml due volte al giorno

da 2,6 a 5 kg: 2 ml due volte al giorno

da 5,1 a 7 kg: 3 ml due volte al giorno

da 7,1 a 9 kg: 4 ml due volte al giorno

da 9,1 a 11 kg : 5 ml due volte al giorno

(1 ml = 1 cc di pasta)

Il trattamento va continuato per 5 giorni. Le modalità ed il periodo di trattamento possono essere adattate al singolo caso clinico a giudizio del Medico Veterinario.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

L'uso della amoxicillina nelle infezioni sostenute da stafilococchi dovrebbe essere preceduta da una accurata indagine in quanto tali germi potrebbero aver sviluppato resistenza all'antibiotico.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Mantenere il prodotto in confezionamento integro a temperatura non superiore a 25°C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Scad.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 12 giorni.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'uso della amoxicillina nelle infezioni sostenute da stafilococchi dovrebbe essere preceduta da una accurata indagine in quanto tali germi potrebbero aver sviluppato resistenza all'antibiotico.

In animali affetti da insufficienza renale o epatica la posologia deve essere valutata con cura.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le penicilline possono causare reazioni da ipersensibilità a seguito di ingestione o contatto con la pelle. Tali reazioni possono essere occasionalmente molto serie. Si può sviluppare ipersensibilità crociata tra penicilline e cefalosporine e viceversa.

Le persone con nota ipersensibilità all'amoxicillina o ad altre penicilline o a cefalosporine devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Fare attenzione durante la somministrazione del prodotto.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Il prodotto può essere usato in gravidanza e allattamento in seguito a valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del medico veterinario.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

La somministrazione contemporanea di amoxicillina con antibiotici ad azione batteriostatica, quali tetracicline e macrolidi, deve essere evitata in quanto viene ridotta l'attività antibatterica dell'amoxicillina.

È noto l'effetto sinergico tra Penicilline semi-sintetiche ed Aminoglicosidi pertanto è bene evitare l'associazione con altri farmaci nefrotossici o altri antibiotici nefrotossici (aminoglicosidi).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

Non superare la posologia prescritta.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli abituali punti di raccolta per i medicinali scaduti o non utilizzati.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

09/2023

15. ALTRE INFORMAZIONI

Presentazione – Siringa da 15 ml di pasta orale.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.