

## BIPACKSEDEL

### Ethacilin vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension

**1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:

Intervet Productions  
Via Nettunense km 20,300  
04011 Aprilia (LT) Italien

**2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Ethacilin vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension  
bensylpenicillinprokain

**3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

1 ml injektionsvätska innehåller: Bensylpenicillinprokain (motsvarande 300.000 IE) 300 mg, lecitin, povidon, dinatriumedetat, natriumcitratdihydrat, kaliumdivätefosfat., metylparahydroxibensoat, fosforsyra (pH-justering), natriumhydroxid (pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

**4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)**

Ethacilin vet. innehåller bensylpenicillin. Penicillin hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien.

Används vid infektioner orsakade av bakterier känsliga för bensylpenicillinprokain. Exempelvis juverinflammation, lunginflammation, rödsjuka, livmoderinflammation och njurinflammation.

**5. KONTRAINDIKATIONER**

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. Sjukdomar orsakade av penicillinasproducerande stafylokokker skall ej behandlas med Ethacilin vet.

## **6. BIVERKNINGAR**

Allergiska överkänslighetsreaktioner och gastrointestinala störningar kan förekomma.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **7. DJURSLAG**

Häst, nöt, svin, får, hund och katt.

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)**

1 ml injektionsvätska innehåller 300 mg bensylpenicillinprokain.  
Ethacilin vet. injiceras i muskeln eller under huden 1 gång dagligen. Får ej ges under huden till häst.  
Behandlingstid minst 3 dagar. Normaldosering: 20 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 7 ml/100 kg.

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

Upprepade injektioner ges på olika injektionsställen.

## **10. KARENSTID(ER)**

Kött och slaktbiprodukter: Nöt, häst, svin och får: 14 dygn  
Mjolk: 6 dygn

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.  
Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar i kylskåp.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

## **12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)**

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:  
Inga.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer som är allergiska mot penicillin bör undvika direkt hudkontakt med preparatet.

**13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

2019-01-14

**15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

100 ml och 250 ml PET-flaskor (polyetylen terephthalat). Gummipropp av halogenerad butyl, förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

Förpackningsstorlekar:

1x100 ml, 6x100 ml, 12x100 ml, 48x100 ml, 5x10x100 ml, 96x100 ml, 192x100 ml  
1x250 ml, 10x250 ml, 12x250 ml, 24x250 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.