

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1498**

IBA-VAC liofilizāts iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

**1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (BO)
Itālija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

IBA-VAC liofilizāts iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Dzīvs, novājināts putnu infekciozā bursīta vīrusa celms 1/65/PV ne mazāk kā 10^3 EID₅₀ /devā

Palīgviela: Laktoze fizioloģiskā sāls šķīdumā (0,9% Na Cl).

4. INDIKĀCIJA

Cāļu vakcinācijai pret putnu infekciozo bursītu.
Imunitāte izveidojas 10-15 dienas pēc vakcinācijas.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileru, dējējvistu cāļi un vaislas ganāmpulka cāļi).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Vakcīnas sagatavošana.

Atšķaidiet vakcīnu ar nelielu daudzumu ūdens un pievienojiet vakcinācijai nepieciešamajam ūdens daudzumam. Pirms lietošanas uzmanīgi samaisiet vakcīnas ūdens maisījumu. Vakcīnu sagatavojiet tieši pirms lietošanas.

Ūdens daudzums, kas nepieciešams vakcinācijai ir atkarīgs no putnu vecuma, sezonas un vides temperatūras.

Ieteicamais ūdens daudzums:

Cāļu vecums nedēļās	Ūdens daudzums litros uz 1000 devām
0 – 2	7 – 10
3 – 5	10 – 20
6 – 12	20 – 60
vairāk par 12	50 – 80

Vakcinācijas programma:

IBA-VAC var lietot gan broileriem, gan dējējvistām, kuri iegūst ilgstošu imunitāti pēc vienreizējas vakcinācijas.

Vakcināciju veic vakcīnu izdzirdinot ar dzeramo ūdeni. Ieteicamais putnu vakcinēšanas vecums ir 12-15 dienu vecumā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai sasniegtu atbilstošu imunitāti, jāievēro šādi nosacījumi:

- pārliecinieties, lai dzeramā ūdens traukos nav mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu atliekas;
- izmantojiet emaljētus, plastmasas vai stikla traukus;
- 3 stundas pirms vakcinācijas pārtrauciet putniem ūdens padevi;
- nodrošiniet pietiekamu ūdens trauku daudzumu, lai putni varētu izdzert vakcīnas ūdens maisījumu 2-3 stundu laikā;
- sagatavoto vakcīnu nepakļaujiet paaugstinātas temperatūras.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 0 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā no +2 līdz +8 °C.

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 18 mēneši.

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas atšķaidīšanai saskaņā ar norādījumiem: 2 stundas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcīnas ievadīšanai nedrīkst izmantot ūdeni, kas satur dezinfekcijas līdzekļus, jo tie var neitralizēt vakcīnu.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Jāveic atbilstoši veterinārie un labturības pasākumi, lai izvairītos no vakcīnas celma izplatīšanās uz slimības uzņēmīgu sugu dzīvniekiem.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Vakcīnas lietotājam rūpīgi jānomazgā rokas un jāizvairās no jebkādas vakcīnas saskares ar acīm.

Personām ar pastiprinātu jutību pret šo vakcīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā un 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads,

LV-3430, Latvija