

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

PARASSICID COLLARE 150 mg/g collare antiparassitario per cani e gatti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

100 g di prodotto contengono: *principio attivo*: Diazinone 15 g; *eccipienti*: q.b. a 100 g.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Collare

Collare in PVC di colore marrone scuro.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani, gatti.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Trattamento delle infestazioni da pulci nei gatti e da pulci e zecche nei cani. Protegge per 4 mesi.

Agisce nei riguardi degli ectoparassiti di cani e gatti, in particolare contro:

- cane: pulci (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*);

- gatto: pulci (*Ctenocephalides felis*).

4.3 Controindicazioni

Non usare su animali in lattazione o in gestazione.

Non usare su cuccioli con età inferiore a 5 mesi.

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Alcuni animali possono essere sensibili al collare per cui è consigliabile controllare il collo dell'animale nei primi giorni.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

In caso di irritazione cutanea, togliere immediatamente il collare.

Vedere anche sez. 4.3 (controindicazioni) e sez. 4.10 (sovradosaggio).

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Non superare le dosi consigliate. E' necessario un controllo continuativo dell'integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza a contatto con l'animale. Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso se prolungato dei prodotti per uso topico può dare fenomeni di sensibilizzazione, pertanto togliere il collare ai primi segni di irritazione o di reazioni avverse. Un collare troppo aderente può provocare irritazioni della cute. In tal caso deve essere momentaneamente tolto. In animali altamente sensibili, si possono verificare irritazioni/prurito della pelle, in particolare nei primi giorni successivi all'applicazione del collare. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. Evitare che il prodotto possa essere inalato o ingerito dagli animali. Per ridurre la reinfestazione si raccomanda di trattare tutti i cani e gatti conviventi nell'ambiente domestico e si consiglia l'uso aggiuntivo di un adeguato trattamento ambientale (es. tappeti, divani, ecc.) contro le pulci adulte e/o i loro stadi di sviluppo.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Utilizzare un paio di guanti per l'applicazione del prodotto. Evitare di ingerire il prodotto durante il trattamento. Non contaminare durante l'uso alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerli. Dopo l'impiego, risciacquare le mani con acqua corrente e sapone. Il prodotto è tossico per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle. In caso di malessere o ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico mostrandogli il contenitore o il foglietto illustrativo. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Tenere ben chiusa la confezione fino al momento dell'uso. Le persone con nota ipersensibilità al Diazinone e agli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento. In caso di reazioni avverse potrebbero verificarsi: irritazioni/prurito della pelle, eccesso di salivazione, secrezioni respiratorie, tremori, convulsioni e fascicolazioni.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

Non utilizzare su femmine in gestazione o in allattamento.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note interazioni farmacologiche del prodotto, è comunque opportuno non utilizzare contemporaneamente ad altri organofosforici o carbammati o altri antiparassitari mentre il collare è indossato e nei 14 giorni successivi all'asportazione.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Un collare per animale.

Aprire il sacchetto ed allacciare il collare al collo dell'animale (tenendo conto della crescita), tagliare la parte eccedente avendo cura di gettarla negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali veterinari non utilizzati o scaduti.

In tutti i soggetti si riscontra, entro poche ore dall'applicazione, la completa scomparsa di pulci e zecche che muoiono cadendo a terra spontaneamente o dopo un'accurata spazzolatura.

La presenza del collare evita la reinfestazione da parassiti.

Il collare, per le particolari caratteristiche del principio attivo, non teme l'umidità né perde attività in acqua o sotto la pioggia.

Il collare garantisce una protezione fino a 4 mesi.

Cane: l'applicazione di un collare di 60 cm a un cane di razza piccola/media (5-20 kg) equivale a un dosaggio pari a 3,7 – 1,68 mg di diazinone/kg p.v./die.

L'applicazione di un collare di 65 cm a un cane di razza medio grande/grande (>20-45 kg) equivale a un dosaggio pari a 2,20-1,03 mg di diazinone/kg p.v./die.

Gatto: l'applicazione di un collare di 35 cm a gatti di peso compreso tra i 2,5 e i 7 kg equivale a un dosaggio compreso tra 6 e 3,21 mg di diazinone/kg p.v./die.

Tipo di collare	lunghezza	peso	Diazinone tot.	Diazinone/cm di lunghezza	Diazinone/g peso del collare
Collare cane taglia piccola/media	60 cm	27 g	4,05 g	0,0675 g	0,15 g
Collare cane grande	65 cm	37 g	5,55 g	0,0853 g	0,15 g
Collare gatti	35 cm	16 g	2,40 g	0,0685 g	0,15 g

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Non superare le dosi consigliate.

In caso di sovradosaggio potrebbero verificarsi:

1. eccesso di salivazione e secrezioni respiratorie: somministrare atropina (0,02-0,5 mg/kg SC);
2. tremori, convulsioni, fascicolazioni: somministrare diazepam (0,5-1,0 mg/kg IV) ripetuta fino ad ottenere l'effetto desiderato e/o metocarbamolo (44 mg/kg IV) o pentobarbitale (3-15 mg/kg IV lenta) da ripetere fino ad effetto per il controllo delle convulsioni e delle fascicolazioni.

L'induzione della diuresi attraverso una fluidoterapia può favorire l'eliminazione dei metaboliti delle sostanze tossiche e contribuisce a mantenere/ripristinare l'equilibrio idrosalino.

In caso di ingestione o masticazione, consultare immediatamente un medico veterinario e, se possibile, mostrargli l'etichetta.

4.11 Tempo di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitici ad uso topico.

Codice ATCvet: QP53AF03

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Il diazinone è un insetticida della famiglia dei composti organofosforici efficace nell'eliminazione e controllo dei più comuni parassiti esterni del cane e del gatto. L'efficacia è dovuta alla sua attività anticolinesterasica sul parassita.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Nel cane il diazinone viene escreto pressoché totalmente per via renale; nelle urine si evidenzia la presenza di tre metaboliti.

5.3 Proprietà ambientali

Si raccomanda di non contaminare corsi d'acqua con il prodotto e di evitare che gli animali trattati entrino in acqua (mari, laghi e fiumi) perché come tutti gli antiparassitari possono essere potenzialmente tossici per gli organismi acquatici.

6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Cloruro di polivinile
dibutylftalato
olio di soia epossidizzato
calcio stearato
ossido di ferro rosso

6.2 Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale veterinario non deve essere utilizzato con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 4 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare nella confezione originale.

Non aprire la confezione prima dell'uso e conservarla al riparo dalla luce e lontana da fonti di calore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Collare gatti: collare di colore marrone scuro lungo 35 cm circa contenuto in busta sigillata bianca di carta-politene-alluminio-politene confezionata in astuccio di cartone.

Collare cani di taglia piccola e media: collare di colore marrone scuro lungo 60 cm circa contenuto in busta sigillata bianca di carta-politene-alluminio-politene confezionata in astuccio di cartone.

Collare cani taglia grande: collare di colore marrone scuro lungo 65 cm circa contenuto in busta sigillata bianca di carta-politene-alluminio-politene confezionata in astuccio di cartone.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Non contaminare corsi d'acqua, stagni o il terreno.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

FORMEVET S.r.l. - Via Savona 97, 20144 Milano - Italia

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Collare per gatti A.I.C. n. 103230013

Collare per cani di taglia piccola e media A.I.C. n. 103230025

Collare per cani di grossa taglia A.I.C. n. 103230037

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE

30 dicembre 2000

DATA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

30 Dicembre 2010

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Dicembre 2010

11. DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Solo per uso veterinario.

12. MODALITA' DI DISPENSAZIONE

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

ETICHETTA ESTERNA

- 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**
PARASSICID COLLARE 150 mg/g collare antiparassitario per CANI DI TAGLIA PICCOLA e MEDIA
Diazinone
- 2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**
100 g di prodotto contengono: *principio attivo*: Diazinone 0,0-dietil-0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil)-tiofosfato 15 g.
- 3. FORMA FARMACEUTICA**
Collare in PVC di colore marrone scuro.
- 4. CONFEZIONE**
Collare da 60 cm sigillato in busta.
- 5. SPECIE DI DESTINAZIONE**
Cane di taglia piccola e media.
- 6. INDICAZIONI**
Trattamento delle infestazioni del cane da pulci e zecche. Protegge per 4 mesi.
Agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani, in particolare contro: pulci (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*).
- 7. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si leggerà "POSOLOGIA:")
- 8. TEMPO DI ATTESA**
Non pertinente.
- 9. AVVERTENZE SPECIALI**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.
- 10. DATA DI SCADENZA**
Scad. {mese/anno}

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
Dopo la prima apertura della busta, usare entro 4 mesi.
- 11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**
Conservare nella confezione originale.
Non aprire la confezione prima dell'uso e conservarla al riparo dalla luce e lontana da fonti di calore.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- 12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

**13. SOLO PER USO VETERINARIO
LA VENDITA NON E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON
E' SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

14. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

**15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei
lotti di fabbricazione:**

Laboratoires Biové - Arques - Francia

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Collare antiparassitario per cani di taglia piccola e media A.I.C. n. 103230025

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n. del

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07

ETICHETTA ESTERNA

- 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**
PARASSICID COLLARE 150 mg/g collare antiparassitario per CANI DI GROSSA TAGLIA
Diazinone
- 2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**
100 g di prodotto contengono: *principio attivo*: Diazinone 0,0-dietil-0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil)-tiofosfato 15 g.
- 3. FORMA FARMACEUTICA**
Collare in PVC di colore marrone scuro.
- 4. CONFEZIONE**
Collare da 65 cm sigillato in busta.
- 5. SPECIE DI DESTINAZIONE**
Cane di grossa taglia.
- 6. INDICAZIONI**
Trattamento delle infestazioni del cane da pulci e zecche. Protegge per 4 mesi.
Agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani, in particolare contro: pulci (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*).
- 7. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si leggerà "POSOLOGIA:")
- 8. TEMPO DI ATTESA**
Non pertinente.
- 9. AVVERTENZE SPECIALI**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.
- 10. DATA DI SCADENZA**
Scad. {mese/anno}

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
Dopo la prima apertura della busta, usare entro 4 mesi.
- 11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**
Conservare nella confezione originale.
Non aprire la confezione prima dell'uso e conservarla al riparo dalla luce e lontana da fonti di calore.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- 12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

**13. SOLO PER USO VETERINARIO
LA VENDITA NON E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON
E' SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

14. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

**15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei
lotti di fabbricazione:**

Laboratoires Biové - Arques - Francia

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Collare antiparassitario per cani di grossa taglia A.I.C. n. 103230037

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n. del

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07

ETICHETTA ESTERNA

- 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**
PARASSICID COLLARE 150 mg/g collare antiparassitario per GATTI
Diazinone
- 2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**
100 g di prodotto contengono: *principio attivo*: Diazinone 0,0-dietil-0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil)-tiofosfato 15 g.
- 3. FORMA FARMACEUTICA**
Collare in PVC di colore marrone scuro.
- 4. CONFEZIONE**
Collare da 35 cm sigillato in busta.
- 5. SPECIE DI DESTINAZIONE**
Gatto.
- 6. INDICAZIONI**
Trattamento delle infestazioni del gatto da pulci. Protegge per 4 mesi.
Agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei gatti, in particolare contro: pulci (*Ctenocephalides felis*).
- 7. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si leggerà "POSOLOGIA:")
- 8. TEMPO DI ATTESA**
Non pertinente.
- 9. AVVERTENZE SPECIALI**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.
- 10. DATA DI SCADENZA**
Scad. {mese/anno}

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
Dopo la prima apertura della busta, usare entro 4 mesi.
- 11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**
Conservare nella confezione originale.
Non aprire la confezione prima dell'uso e conservarla al riparo dalla luce e lontana da fonti di calore.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- 12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.
- 13. SOLO PER USO VETERINARIO**
LA VENDITA NON E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON E' SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

14. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Laboratoires Biové - Arques - Francia

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Collare antiparassitario per gatti A.I.C. n. 103230013

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n. del

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

PARASSICID COLLARE

150 mg/g collare antiparassitario per cani e gatti

Diazinone

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:

Laboratoires Biové – Arques – Francia

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

PARASSICID COLLARE 150 mg/g collare antiparassitario per cani e gatti.

Diazinone

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 g di prodotto contengono: *principio attivo*: Diazinone 0,0-dietil-0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidil)-tiofosfato 15 g.

4. INDICAZIONI

Trattamento delle infestazioni da pulci nei gatti e da pulci e zecche nei cani. Protegge per 4 mesi.

Agisce nei riguardi degli ectoparassiti di cani e gatti, in particolare contro:

- cane: pulci (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*);

- gatto: pulci (*Ctenocephalides felis*).

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare su animali in lattazione o in gestazione.

Non usare su cuccioli con età inferiore a 5 mesi.

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Alcuni animali possono essere sensibili al collare per cui è consigliabile controllare il collo dell'animale nei primi giorni.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

6. REAZIONI AVVERSE

In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento. In caso di reazioni avverse potrebbero verificarsi: irritazioni/prurito della pelle, eccesso di salivazione, secrezioni respiratorie, tremori, convulsioni e fascicolazioni. Nei primi giorni dell'uso controllare il collo dell'animale, in caso di reazioni avverse consultare un veterinario mostrandogli l'etichetta. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani, gatti.

8. POSOLOGIA, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Un collare per animale.

Aprire il sacchetto ed allacciare il collare al collo dell'animale (tenendo conto della crescita), tagliare la parte eccedente avendo cura di gettarla negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali veterinari non utilizzati o scaduti.

In tutti i soggetti si riscontra, entro poche ore dall'applicazione, la completa scomparsa di pulci e zecche che muoiono cadendo a terra spontaneamente o dopo un'accurata spazzolatura.

La presenza del collare evita la reinfestazione da parassiti.

Il collare, per le particolari caratteristiche del principio attivo, non teme l'umidità né perde attività in acqua o sotto la pioggia.

Il collare garantisce una protezione fino a 4 mesi.

Cane: l'applicazione di un collare di 60 cm a un cane di razza piccola/media (5-20 kg) equivale a un dosaggio pari a 3,7 – 1,68 mg di diazinone/kg p.v./die.

L'applicazione di un collare di 65 cm a un cane di razza medio grande/grande (>20-45 kg) equivale a un dosaggio pari a 2,20-1,03 mg di diazinone/kg p.v./die.

Gatto: l'applicazione di un collare di 35 cm a gatti di peso compreso tra i 2,5 e i 7 kg equivale a un dosaggio compreso tra 6 e 3,21 mg di diazinone/kg p.v./die.

Tipo di collare	lunghezza	peso	Diazinone tot.	Diazinone/cm di lunghezza	Diazinone/g peso del collare
Collare cane taglia piccola/media	60 cm	27 g	4,05 g	0,0675 g	0,15 g
Collare cane grande	65 cm	37 g	5,55 g	0,0853 g	0,15 g
Collare gatti	35 cm	16 g	2,40 g	0,0685 g	0,15 g

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere quanto riportato al punto "Controindicazioni", al punto "Posologia, via e modalità di somministrazione" e al punto "Avvertenze speciali" del presente foglietto illustrativo.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale.

Non aprire la confezione prima dell'uso e conservarla al riparo dalla luce e lontana da fonti di calore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dopo la prima apertura della busta, usare entro 4 mesi.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

In caso di irritazione cutanea, togliere immediatamente il collare.

Vedere anche quanto riportato al punto "Controindicazioni" e al punto "Sovradosaggio" del presente foglietto illustrativo.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Non superare le dosi consigliate. E' necessario un controllo continuativo dell'integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza a contatto con l'animale. Utilizzare il prodotto

secondo le modalità d'uso indicate. L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare fenomeni di sensibilizzazione, pertanto togliere il collare ai primi segni di irritazione o di reazioni avverse e consultare il medico veterinario. Un collare troppo aderente può provocare irritazioni della cute. In tal caso deve essere momentaneamente tolto. In animali altamente sensibili, si possono verificare irritazioni/prurito della pelle, in particolare nei primi giorni successivi all'applicazione del collare. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. Evitare che il prodotto possa essere inalato o ingerito dagli animali. Per ridurre la reinfestazione si raccomanda di trattare tutti i cani e gatti conviventi nell'ambiente domestico e si consiglia l'uso aggiuntivo di un adeguato trattamento ambientale (es. tappeti, divani, ecc.) contro le pulci adulte e/o i loro stadi di sviluppo.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Utilizzare un paio di guanti per l'applicazione del prodotto. Evitare di ingerire il prodotto durante il trattamento. Non contaminare durante l'uso alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerli. Dopo l'impiego, risciacquare le mani con acqua corrente e sapone. Il prodotto è tossico per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle. In caso di malessere o ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico mostrandogli il contenitore o il foglietto illustrativo. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Tenere ben chiusa la confezione fino al momento dell'uso. Le persone con nota ipersensibilità al Diazinone e agli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Si raccomanda di non contaminare corsi d'acqua con il prodotto e di evitare che gli animali trattati entrino in acqua (mari, laghi e fiumi) perché come tutti gli antiparassitari possono essere potenzialmente tossici per gli organismi acquatici.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento

Non utilizzare su femmine in gestazione o in allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note interazioni farmacologiche del prodotto, è comunque opportuno non utilizzare contemporaneamente ad altri organofosforici o carbammati o altri antiparassitari mentre il collare è indossato e nei 14 giorni successivi all'asportazione.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Non superare le dosi consigliate.

In caso di incidente, malessere o reazione cutanea consultare un medico veterinario e se possibile mostrargli l'etichetta.

In caso di sovradosaggio potrebbero verificarsi:

1. eccesso di salivazione e secrezioni respiratorie: somministrare atropina (0,02-0,5 mg/kg SC);
2. tremori, convulsioni, fascicolazioni: somministrare diazepam (0,5-1,0 mg/kg IV) ripetuta fino ad ottenere l'effetto desiderato e/o metocarbamolo (44 mg/kg IV) o pentobarbitale (3-15 mg/kg IV lenta) da ripetere fino ad effetto per il controllo delle convulsioni e delle fascicolazioni.

L'induzione della diuresi attraverso una fluidoterapia può favorire l'eliminazione dei metaboliti delle sostanze tossiche e contribuisce a mantenere/ripristinare l'equilibrio idrosalino.

In caso di ingestione o masticazione, consultare immediatamente un medico veterinario e, se possibile, mostrargli l'etichetta.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale veterinario non deve essere utilizzato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Non contaminare corsi d'acqua, stagni o il terreno.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Dicembre 2010

15. ALTRE INFORMAZIONI

Proprietà farmacologiche

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitici ad uso topico.

Codice ATCvet: QP53AF03

Proprietà farmacodinamiche

Il diazinone è un insetticida della famiglia dei composti organofosforici efficace nell'eliminazione e controllo dei più comuni parassiti esterni del cane e del gatto. L'efficacia è dovuta alla sua attività anticolinesterasica sul parassita.

Informazioni farmacocinetiche

Nel cane il diazinone viene escreto pressoché totalmente per via renale; nelle urine si evidenzia la presenza di tre metaboliti.

SOLO PER USO VETERINARIO

LA VENDITA NON E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON E' SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

Collare per gatti

A.I.C. n. 103230013

Collare per cani di taglia piccola e media

A.I.C. n. 103230025

Collare per cani di grossa taglia

A.I.C. n. 103230037

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.