

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PGF Veyx forte 0,250 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält 0,250 mg Cloprostenol (entsprechend 0,263 mg Cloprostenol-Natrium).

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

20 ml

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh und Färse), Schwein (Sau).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Stunden.

Schweine:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE
--

Nicht über 25 °C lagern.
Vor Licht schützen.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“
--

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“
--

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Veyx-Pharma GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 401539.01.00
AT: Z.Nr.: 8-01094

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche, 10 ml, 20 ml und 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PGF Veyx forte

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 ml Lösung enthält: 0,250 mg Cloprostenol

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____