

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Boflox 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Marbofloxacin 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml

1 x 250 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schwein (Sau)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**Rinder: Intramuskuläre (i.m.), subkutane (s.c.) oder intravenöse (i.v.) Anwendung

Schweine (Sauen): Intramuskuläre (i.m.) Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:Atemwegserkrankungen:

- 8 mg/kg Einzeldosis (i.m.):

Essbare Gewebe : 3 Tage.

Milch : 72 Stunden.

- 2 mg/kg über 3-5 Tage (i.v./s.c./i.m.):

Essbare Gewebe : 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

Akute Mastitis:

- 2 mg/kg über 3 Tage (i.v./s.c./i.m.):

Essbare Gewebe : 6 Tage.
Milch: 36 Stunden.

Schweine (Sauen):

Essbare Gewebe: 4 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen
Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V445706

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM DER PRIMÄRVERPACKUNG**ETIKETT 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Boflox 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Marbofloxacin 100 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schwein (Sau)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: Intramuskuläre, subkutane oder intravenöse Injektion

Schweine (Sauen): Intramuskuläre Injektion

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:Atemwegserkrankungen:

- 8 mg/kg Einzeldosis (i.m.):

Essbare Gewebe : 3 Tage.

Milch : 72 Stunden.

- 2 mg/kg über 3-5 Tage (i.v./s.c./i.m.):

Essbare Gewebe : 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

Akute Mastitis:

- 2 mg/kg über 3 Tage (i.v./s.c./i.m.):

Essbare Gewebe : 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

Schweine (Sauen):

Essbare Gewebe: 4 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ... 7

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}