

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE**  
**P.G. 600** prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN BOXMEER  
Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nizozemsko

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1a  
D-85716 Unterschleissheim  
Německo

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**  
**P.G. 600** prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 dávka (5 ml po naředění)

**Léčivé látky:**

Gonadotrophinum chorionicum	200 IU
Gonadotrophinum sericum	400 IU

**4. INDIKACE**

Léčba anestrů, indukce říje, synchronizace a diagnostika březosti u prasnic a prasniček.

**5. KONTRAINDIKACE**

Nejsou.

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Velmi zřídka se může objevit anafylaktoidní reakce, v takovém případě se aplikují intravenózně nebo intramuskulárně glukokortikoidy nebo adrenalin (1:1000).

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Prasnice, prasničky.

**8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Aplikuje se jedna dávka o objemu 5 ml po naředění přiloženým zředovačem na kus subkutánně nebo intramuskulárně v krajině za uchem.

	Indikace *	Doba aplikace
Prasnice	Odstartování cyklu	0.-2.den po odstavu
	Zvětšení vrhu při subfertilitě	0.-2.den po odstavu
	Anestrus (tichá říje)	přibližně 10. den po odstavu
	Diagnostika březosti	přibližně 80 dní po připuštění
Prasničky	Anestrus (tichá říje)	ve věku 8-10 měsíců

	Indukce říje u pohlavně nedospělých prasniček	ve věku 5,5-6,5 měsíců nebo při živé hmotnosti 85-100 kg. (prasničky lze připouštět již při první říji po aplikaci. Prasničky připuštěné až při druhé říji po aplikaci mívají početnější vrhy.)
	Diagnostika březosti	přibližně 80 dní po připuštění

\* Synchronizace říje: při všech uvedených indikacích nastupuje říje 3-6 dní po aplikaci PG 600.

## 9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

### 10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

### 11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

Po naředění podle návodu spotřebujte do 24 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale

### 12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.

### 13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

### 14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

### 15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

P.G. 600 je lyofilizovaná směs humánního choriového gonadotropinu (hCG) a sérového gonadotropinu březích klisen (PMSG). Sérový gonadotropin působí podobně jako folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH) a vyvolává růst folikulů. Choriový gonadotropin působí jako LH a podporuje ovulaci folikulů a růst žlutého tělíska. Kombinace těchto hormonů vyvolává u prasat fertlní říjový cyklus.