

NAVODILO ZA UPORABO

Furosemide 5%, Alfasan, raztopina za injiciranje za pse in mačke

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Alfasan International BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nizozemska

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Furosemide 5%, Alfasan, raztopina za injiciranje za pse in mačke

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

Zdravilne učinkovine na 1 ml raztopine:
furosemid 50 mg.

4. INDIKACIJA(E)

Furosemid je namenjen zdravljenju edemov (kongestija pljuč, ascites) v povezavi s srčnim popuščanjem in akutnimi nevnetnimi edemi tkiv.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v primerih težje motnje v delovanju jeter ali ledvic, anurije ali hipovolemije.
Ne uporabite v primerih preobčutljivosti na učinkovino ali na katero koli pomožno snov.

6. NEŽELENI UČINKI

V redkih primerih lahko furosemid pri živalih, ki so nagnjene h hipokalcemiji, povzroči padec serumskega kalcija in posledične tetanije.

Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:

- zelo pogosti (neželeni učinki se pokažejo pri več kot 1 od 10 zdravljenih živali)
- pogosti (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 100 zdravljenih živali)
- občasni (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 1.000 zdravljenih živali)
- redki (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 10.000 zdravljenih živali)
- zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 zdravljenih živali, vključno s posameznimi primeri).

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi, mačke.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Zdravilo dajemo intravenozno (i/v):

- psi, mačke: 0,5 do 1,0 ml / 10 kg telesne mase (= 2,5-5 mg/kg), dvakrat dnevno. Po potrebi lahko odmerke podvojimo.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Furosemid je močno učinkovit diuretik in saluretik. V primeru predoziranja lahko povzroči dehidracijo in elektrolitsko neravnovesje. Neravnovesja lahko zdravimo s primerno tekočinsko terapijo.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi 15 do 25 °C.

Zaščitite pred svetlobo.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni.

Po prvem odpiranju stične ovojnine, shranjujte pri temperaturi 2 °C – 8 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojninu po {EXP}.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto

Pred kirurškim posegom je treba živalim, zdravljenim s furosemidom, pregledati nivo elektrolitov.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Niso znani.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Pazite, da ne pride do nenamernega samo-injiciranja.

V primeru nenamernega samo-injiciranja ali razlitja po koži se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

V primeru stika s kožo ali očmi, prizadete dele takoj sperite s čisto tekočo vodo.

Po uporabi si umijte roke.

Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Ne uporabite v celotnem obdobju brejosti.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Potrebna je previdnost pri živalih, ki sočasno dobivajo: aminoglikozide, digitalis in njegove glikozide, vitamin C, ureo, Ca-glukonat, tetracikline, adrenalin in steroide, ki izplavljajo kalij.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi), (če je potrebno)

Furosemid je močno učinkovit diuretik in saluretik. V primeru predoziranja lahko povzroči dehidracijo in elektrolitsko neravnovesje. Neravnovesja lahko zdravimo s primerno tekočinsko terapijo.

Glavne inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

16.5.2019

15. DRUGE INFORMACIJE

50 ml rjave steklene vial.