

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Temprace 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:
acepromazin 0,5 mg
(kar ustreza 0,678 mg acepromazinijevega maleata)

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml
20 ml
100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi, mačke.

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Intravenska uporaba.

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vialo shranjujte v zunanji ovojni, da se zaščití pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Le Vet. Beheer B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0607/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Steklene vial s 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Temprace 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:
acepromazin 0,5 mg
(kar ustreza 0,678 mg acepromazinijevega maleata)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi, mačke.

**4. POTI UPORABE**

Intravenska uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA**6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Le Vet. Beheer B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Steklene viala s po 10 ali 20 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Temprace



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Acepromazin 0,5 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {število}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odperto zdravilo uporabite v 28 dneh.