

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Presedine 10 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**Detomidinhydrochlorid 10,0 mg/ml  
(entsprechend 8,36 mg Detomidin)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**5 ml  
10 ml  
20 ml**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Rind

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen oder intramuskulären Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Pferde:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Rinder:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: 12 Stunden

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis \_\_/\_\_/\_\_

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V661660

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**


Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Durchstechflaschen aus Glas zu 5 ml (in einer 10-ml-Durchstechflasche)**  
**Durchstechflaschen aus Glas zu 10 ml**  
**Durchstechflaschen aus Glas zu 20 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Presedine

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Detomidinhydrochlorid 10,0 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.