

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel (50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE

Tulathromycin 100 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml

4. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine und Schafe

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: subkutane Anwendung.
Schweine und Schafe: intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Essbare Gewebe:
Rinder: 22 Tage.
Schweine: 13 Tage.
Schafe: 16 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.
Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Bimeda Animal Health Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V571146

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche (100 ml / 250 ml / 500 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Tulathromycin 100 mg/ml

3. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine und Schafe

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: subkutane Anwendung.
Schweine und Schafe: intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rinder: 22 Tage.

Schweine: 13 Tage.

Schafe: 16 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von : / / verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche (50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Tulathromycin 100 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von ... verbrauchen.