

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Canigen DHA₂PPi/LR

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC S.A.
Iére Avenue-2065m
F-06516 Carros Cedex
Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen DHA₂PPi/LR
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 dávce (1 dávka = 1 ml)

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum	10 ³ -10 ⁵ CCID ₅₀ *
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum (adenovirus 2)	10 ⁴ -10 ⁶ CCID ₅₀ *
Parvovirus enteritidis canis attenuatum	10 ⁵ -10 ⁷ CCID ₅₀ *
Virus parainfluenzis canis attenuatum	10 ⁵ -10 ⁷ CCID ₅₀ *

Tekutá složka (rozpouštědlo):

Leptospira canicola inactivata	min. 40 Hamster PD ₈₀ **
Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata	min. 40 Hamster PD ₈₀ **
Virus rabiei inactivatum	min. 1 IU

* 50% infekční dávka pro buněčné kultury

** 80% ochranná dávka, křeček (dle monografie evropského lékopisu)

Adjuvans:

3% suspenze algeldrátu	10%
------------------------------	-----

4. INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, leptospiroze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobených virem parainfluenzy.

Nástup imunity byl prokázán po 3 týdnech u psinky, parvovirózy, infekční laryngotracheitidy (CAV-2) a vztekliny, po 4 týdnech u infekční hepatitidy (CAV-1) a parainfluenzy, po 5 týdnech u L.canicola a po 2 týdnech u L. icterohaemorrhagiae.

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci u všech složek.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U většiny zvířat se po vakcinaci vytvoří mírný a přechodný otok, který může být bolestivý. Tato reakce odezní spontánně do 7 až 14 dnů bez léčby. Mohou být také občas pozorovány hypersenzitivní reakce, horečka, apatie. V případě anafylaktického šoku je třeba zahájit adekvátní symptomatickou léčbu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po smíchání lyofilizované a tekuté složky podávejte subkutánně jednu dávku Canigenu DHA₂PPi/LR dle následujícího vakcinačního schéma:

Primovakcinace

Jedna injekce Canigenu DHA₂PPi/LR u štěňat od 12 týdnů věku. Po 15-30 dnech druhá injekce Canigenu DHA₂PPi/L.

Nebo:

Jedna injekce Canigenu DHA₂PPi/LR u štěňat od 12 týdnů věku po předchozí aplikaci jedné dávky Canigenu DHA₂PPi/L u štěňat od 8 týdnů věku.

Revakcinace

Jednou ročně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Doporučuje se provést odčervení alespoň 10 dnů před vakcinací.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.
Vakcínu použijte bezprostředně po naředění.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Lze použít u březích fen, které již byly dříve vakcinovány vakcínami řady CANIGEN.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady .

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2010

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Velikosti balení: 10x1 dávka, 25x1dávka, 50x1 dávka
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.