

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CANVAC DHPPiL+R, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje liofilizato dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų	$\geq 10^{2,7}$ EID ₅₀ ,
gyvų nusilpnintų šunų infekcinio laringotracheito virusų	$\geq 10^{3,5}$ TCID ₅₀ ,
gyvų nusilpnintų šunų parvovirusinio enterito virusų	≥ 128 HAU,
gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų	$\geq 10^3$ TCID ₅₀ ,
inaktyvintų <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , <i>L. grippotyphosa</i> ir <i>L. seje</i> – antikūnų titras ne mažesnis kaip 1:32;	

pagalbinės medžiagos:

liofilizavimo terpės	iki 1 ml.
----------------------	-----------

Vienoje skiediklio dozėje (1 ml) yra:

veikliosios medžiagos:

inaktyvintų pasiutligės virusų	≥ 2 TV;
--------------------------------	--------------

pagalbinių medžiagų:

tiomersalio	< 0,1 mg,
aliuminio hidroksido gelio	$\geq 1,4$ mg,
natrio chlorido tirpalo	iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims aktyviai imunizuoti nuo maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirusinio enterito, paragripo, pasiutligės ir trijų tipų leptospirų.

4.3. Kontraindikacijos

Vakcinacija gyvūnui sukelia bendrą imunobiologinį stresą, dėl to vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus. Negalima vakcinuoti gyvūnų, sergančių ūminėmis infekcinėmis ligomis, esant organų patologijai ar karščiavimui, jei po ankstesnės vakcinacijos pasireiškė alergija ar kitos nepalankios reakcijos ar jei gyvūnas yra paveiktas streso (transportavimas, aukšta aplinkos temperatūra, išsekimas ir kt.).

Vakcinos negalima naudoti gyvuliams, sergantiems infekcinėmis ligomis, nuo kurių vakcina sukurta, bei kartu vykdant pasyvią imunizaciją.

Negalima vakcinuoti sergančių pasiutlige gyvūnų ar gyvūnų, kurie turėjo sąlytį su sergančiais pasiutlige gyvūnais ar buvo jų sužaloti.

Gyvūnus, kurie sukandžiojo ar sužeidė žmogų, galima skiepyti tik praėjus nustatytam stebėjimo laikotarpiui.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Gyvūnams po vakcinacijos patartina suteikti maždaug 2–3 dienų poilsį. Jaunikliams poilsis turėtų trukti 1 savaitę. Šunys neturėtų būti treniruojami, naudojami medžioklei ar kitiems aktyviems užsiėmimams. Nerekomenduotina gyvūnus pervežti. Būtina vengti streso.

Per anksti vakcinuotų jauniklių reakcija į vakciną gali būti neadekvati dėl nepilnaverčio imuninio atsako ir neigiamo pasyvaus imuniteto poveikio, kai antikūnai perduoti su krekenomis. Todėl gyvūnus reikia revakcinuoti po pirmosios vakcinacijos praėjus 2–3 savaitėms.

Prieš vakcinaciją gyvūnus rekomenduotina dehelmintizuoti.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį. Injekcijos vietą patartina dezinfekuoti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Kartais gyvūnams gali pakilti temperatūra arba laikinai jie gali netekti apetito. Retais atvejais, po pirmosios vakcinacijos gali pasireikšti anafilaksinės reakcijos. Norint palengvinti bendrą būklę rekomenduotinas simptominis gydymas. Švirkštimo vietoje gali susiformuoti nedidelis tynis, daugumoje atvejų pranykstantis per maždaug 2 sav.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Išskyrus bendras ir pavienes reakcijas, nėra jokio pavojaus vakcinuoti vaikingas pateles ar pateles po apsivaikavimo. Tačiau nerekomenduotina naudoti paskutiniiais vaikingumo mėnesiais arba ką tik po apsivaikavimo.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ankstyvuju ir viduriniuju vaikingumo laikotarpiu bei laktacijos metu. Patelių vakcinacija ir jų imunitetas yra svarbus jauniklių pasyviui imunitetui, kai specifiniai antikūnai jaunikliams perduodami su krekenomis. Šie antikūnai jaunikliams nesukelia jokių nepalankių reakcijų.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Nepriklausomai nuo gyvūno rūšies, amžiaus, lyties ar svorio, vienam gyvūnui po oda už menčių reikia švirkšti 1 ml vakcinos.

Prieš naudojimą vakciną reikia sušildyti.

Į liofilizato CANVAC DHPPiL+R buteliuką reikia sušvirkšti 1 ml CANVAC DHPPiL+R skiediklio, gerai sumaišyti ir sunaudoti nedelsiant.

Vakcinos dozę reikia ištraukti iš buteliuko ir sušvirkšti gyvūnui laikantis aseptikos taisyklių.

Veterinarijos gydytojas turi nustatyti vakcinavimo schemą.

Vakcinuojant jauniklius, būtina atsižvelgti į motinų imuniteto būklę (ar jos buvo vakcinuotos, ar ne).

Rekomenduotina pirmą kartą vakcinuoti 3 mėn. amžiaus šuniukus. Vakcinavus jaunesnius nei 4 mėn. gyvūnus, antrą kartą juos vakcinuoti reikia maždaug po 2–3 sav.

Siekiant sumažinti nepalankų su krekenomis įgyto pasyvaus imuniteto poveikį jaunikliams, antrą kartą juos vakcinuoti rekomenduotina po 3 sav.

Norint išlaikyti nuolatinį vakcinuotų gyvūnų imunitetą, gyvūnus reikia revakcinuoti kasmet.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Liofilizatas yra saugus panaudojus dešimt kartų, skiediklis – du kartus didesnę nei rekomenduotina dozę.

Pastebėtos nepalankios reakcijos (žr. 4.6 punktą).

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvintos virusinės bei bakterinės šunų vakcinos.

ATCvet kodas: Q15AA.

5.1. Farmakologinės savybės

Vakcina skatina specifinio imuniteto formavimąsi. Aktyvus imunitetas susidaro palaipsniui priklausomai nuo parenteriniai sušvirkšto imunogeno. Vakcinuoti gyvūnai yra dalinai apsaugoti praėjus 7 d. po vakcinacijos. Pakankamas imunitetas susidaro per 2–3 sav. po vakcinacijos. Revakcinavus imunitetas trukka ne trumpiau nei 1 metus.

Specifinė gyvūno apsauga prieš ligą ypač susijusi su humoraliniu imunitetu, tuo tarpu jauniklius saugo ir su krekenomis gauti motininiai antikūnai.

5.2. Farmakodinaminės savybės

Sušvirkštus vakciną, gyvūnų organizme vakcinos antigenas palaipsniui atpalaiduojamas ir skatina aktyvaus imuniteto susidarymą.

Susidarant specifiniam imunitetui, antigenai palaipsniui aktyviai skyla ir metabolizuojami.

Inaktyvinti vakcinos komponentai po gyvūno imunizacijos metabolizuojami, suskaldomi ir išskiriami iš organizmo.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Liofilizavimo terpė, tiomersalis, aliuminio hidroksido gelis, natrio chlorido tirpalas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

Kadangi veterinarinis vaistas yra polivalentinė vakcina, nepatartina vakcinuoti kartu naudojant kitus veterinarinius vaistus.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

3 ml talpos stikliniai arba plastikiniai buteliukai po 1 ml liofilizato arba skiediklio, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse arba plastikinėse dėžutėse po 3, 6, 30 ar 60 buteliukų liofilizato ir skiediklio.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Dyntec spol. s r. o.
Pražská 328
411 55 Terezín
ČEKIJOS RESPUBLIKA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1863/001-004

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009-06-24
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014-08-07

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2016-07-14

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CANVAC DHPPiL+R, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje liofilizato dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų	$\geq 10^{2,7}$ EID ₅₀ ,
gyvų nusilpnintų šunų infekcinio laringotracheito virusų	$\geq 10^{3,5}$ TCID ₅₀ ,
gyvų nusilpnintų šunų parvovirusinio enterito virusų	≥ 128 HAU,
gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų	$\geq 10^3$ TCID ₅₀ ,
inaktyvintų <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , <i>L. grippotyphosa</i> ir <i>L. sejroe</i> – antikūnų titras ne mažesnis kaip 1:32;	

pagalbinės medžiagos:

lioofilizavimo terpės	iki 1 ml.
-----------------------	-----------

Vienoje skiediklio dozėje (1 ml) yra:

veikliosios medžiagos:

inaktyvintų pasiutligės virusų	≥ 2 TV;
--------------------------------	--------------

pagalbinių medžiagų:

tiomersalio	< 0,1 mg,
aliuminio hidroksido gelio	$\geq 1,4$ mg,
natrio chlorido tirpalo	iki 1 ml.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai.

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 buteliukai po 1 dozę liofilizato ir skiediklio.
6 buteliukai po 1 dozę liofilizato ir skiediklio.
30 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir skiediklio.
60 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir skiediklio.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Šunims aktyviai imunizuoti nuo maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirusinio enterito, paragripo, pasiutligės ir trijų tipų leptospirų.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda už menčių.
Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atskiedus sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dyntec spol. s r. o.
Pražská 328, 411 55 Terezín
ČEKIJOS RESPUBLIKA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1863/001

LT/2/09/1863/002

LT/2/09/1863/003

LT/2/09/1863/004

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
LIOFILIZATO BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CANVAC DHPPiL+R, liofilizatas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų

$\geq 10^{2,7}$ EID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų infekcinio laringotracheito virusų

$\geq 10^{3,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų parvovirusinio enterito virusų

≥ 128 HAU,

gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų

$\geq 10^3$ TCID₅₀,

inaktyvintų *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *L. grippotyphosa* ir *L. sejroe* – antikūnų titras ne mažesnis kaip 1:32.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

5. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
SKIEDIKLIO BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CANVAC DHPPiL+R, skiediklis

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vienoje dozėje (1 ml) yra:
inaktyvintų pasiutligės virusų ≥ 2 TV.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

5. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
CANVAC DHPPiL+R, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Dyntec spol. s r. o.
Pražská 328
411 55 Terezín
ČEKIJOS RESPUBLIKA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CANVAC DHPPiL+R, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje liofilizato dozėje (1 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų	$\geq 10^{2,7}$ EID ₅₀ ,
gyvų nusilpnintų šunų infekcinio laringotracheito virusų	$\geq 10^{3,5}$ TCID ₅₀ ,
gyvų nusilpnintų šunų parvovirusinio enterito virusų	≥ 128 HAU,
gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų	$\geq 10^3$ TCID ₅₀ ,
inaktyvintų <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , <i>L. grippotyphosa</i> ir <i>L. sejroe</i> – antikūnų titras ne mažesnis kaip 1:32;	

pagalbinės medžiagos:

liofilizavimo terpės	iki 1 ml.
----------------------	-----------

Vienoje skiediklio dozėje (1 ml) yra:

veikliosios medžiagos:

inaktyvintų pasiutligės virusų	≥ 2 TV;
--------------------------------	--------------

pagalbinių medžiagų:

tiomersalio	< 0,1 mg,
aliuminio hidroksido gelio	$\geq 1,4$ mg,
natrio chlorido tirpalo	iki 1 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims aktyviai imunizuoti nuo maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirusinio enterito, paragripo, pasiutligės ir trijų tipų leptospirų.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Vakcinacija gyvūnui sukelia bendrą imunobiologinį stresą, dėl to vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus. Negalima vakcinuoti gyvūnų, sergančių ūminėmis infekcinėmis ligomis, esant organų patologijai ar karščiavimui, jei po ankstesnės vakcinacijos pasireiškė alergija ar kitos nepalankios reakcijos ar jei gyvūnas yra paveiktas streso (transportavimas, aukšta aplinkos temperatūra, išsekimas ir kt.).

Vakcinos negalima naudoti gyvuliams, sergantiems infekcinėmis ligomis, nuo kurių vakcina sukurta, bei kartu vykdant pasyvią imunizaciją.

Negalima vakcinuoti sergančių pasiutlige gyvūnų ar gyvūnų, kurie turėjo sąlytį su sergančiais pasiutlige gyvūnais ar buvo jų sužaloti.

Gyvūnus, kurie sukandžiojo ar sužeidė žmogų, galima skiepyti tik praėjus nustatytam stebėjimo laikotarpiui.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Kartais gyvūnams gali pakilti temperatūra arba laikinai jie gali netekti apetito. Retais atvejais, po pirmosios vakcinacijos gali pasireikšti anafilaksinės reakcijos. Norint palengvinti bendrą būklę rekomenduotinas simptominis gydymas. Švirkštimo vietoje gali susiformuoti nedidelis tynis, daugumoje atvejų pranykstantis per maždaug 2 sav.

Pastebėjus bet kokių sunkių poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Nepriklausomai nuo gyvūno rūšies, amžiaus, lyties ar svorio, vienam gyvūnui po oda už menčių reikia švirkšti 1 ml vakcinos.

Prieš naudojimą vakciną reikia sušildyti.

Į liofilizato CANVAC DHPPiL+R buteliuką reikia sušvirkšti 1 ml CANVAC DHPPiL+R skiediklio, gerai sumaišyti ir sunaudoti nedelsiant.

Vakcinos dozę reikia ištraukti iš buteliuko ir sušvirkšti gyvūnui laikantis aseptikos taisyklių.

Veterinarijos gydytojas turi nustatyti vakcinavimo schemą.

Vakcinuojant jauniklius, būtina atsižvelgti į motinų imuniteto būklę (ar jos buvo vakcinuotos, ar ne).

Rekomenduotina pirmą kartą vakcinuoti 3 mėn. amžiaus šuniukus. Vakcinavus jaunesnius nei 4 mėn. gyvūnus, antrą kartą juos vakcinuoti reikia maždaug po 2–3 sav.

Siekiant sumažinti nepalankų su krekenomis įgyto pasyvaus imuniteto poveikį jaunikliams, antrą kartą juos vakcinuoti rekomenduotina po 3 sav.

Norint išlaikyti nuolatinį vakcinuotų gyvūnų imunitetą, gyvūnus reikia revakcinuoti kasmet.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Atskiedus sunaudoti nedelsiant.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Gyvūnams po vakcinacijos patartina suteikti maždaug 2–3 dienų poilsį. Jaunikliams poilsis turėtų trukti 1 savaitę. Šunys neturėtų būti treniruojami, naudojami medžioklei ar kitiems aktyviems užsiėmimams. Nerekomenduotina gyvūnus pervežti. Būtina vengti streso.

Per anksti vakcinuotų jauniklių reakcija į vakciną gali būti neadekvati dėl nepilnaverčio imuninio atsako ir neigiamo pasyvaus imuniteto poveikio, kai antikūnai perduoti su krekenomis. Todėl gyvūnus reikia revakcinuoti po pirmosios vakcinacijos praėjus 2–3 savaitėms.

Prieš vakcinaciją gyvūnus rekomenduotina dehelmintizuoti.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį. Injekcijos vietą patartina dezinfekuoti.

Išskyrus bendras ir pavienes reakcijas, nėra jokio pavojaus vakcinuoti vaikingas pateles ar pateles po apsivaikavimo. Tačiau nerekomenduotina naudoti paskutiniams vaikingumo mėnesiais arba ką tik po apsivaikavimo.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ankstyvuojų ir viduriniuojų vaikingumo laikotarpiu bei laktacijos metu. Patelių vakcinacija ir jų imunitetas yra svarbus jauniklių pasyviui imunitetui, kai specifiniai antikūnai jaunikliams perduodami su krekenomis. Šie antikūnai jaunikliams nesukelia jokių nepalankių reakcijų.

Liofilizatas yra saugus panaudojus dešimt kartų, skiediklis – du kartus didesnę nei rekomenduotina dozę. Pastebėtos nepalankios reakcijos (žr. 6 punktą).

Kadangi veterinarinis vaistas yra polivalentinė vakcina, nepatartina vakcinuoti kartu naudojant kitus veterinarinius vaistus.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-08-06

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.