

## **RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO**



## 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Butox 7,5 Pour On, solução para unção continua para bovinos e ovinos

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

### Substância ativa:

Deltametrina 7,50 mg

### Excipientes:

Solução de formaldeído a 30% 0,19 mg

Para a lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

## 3. FORMA FARMACÊUTICA

Solução para unção contínua.

Suspensão aquosa de cor esbranquiçada.

## 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

### 4.1 Espécies alvo

Bovinos e ovinos.

### 4.2 Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo

Para controlo de Moscas (*Haematobia irritans*, *Hippobosca equina*, *Musca domestica*) em bovinos, Piolhos em bovinos e ovinos (*Linognathus vituli*, *L. ovillus* e *Haematopinus eurystenus*), incluindo os malófagos (*Damalinia ovis* e *D. bovis*) e Carraças em bovinos (*Dermacentor marginatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Rhipicephalus bursa* e *R. sanguineus*).

Uma única aplicação assegura uma proteção eficaz nos animais durante 2 meses contra moscas e piolhos, incluindo os malófagos, e durante 2 a 5 semanas contra carraças em bovinos.

### 4.3 Contraindicações

Não administrar em casos de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes.

Não administrar a equinos destinados ao consumo humano.

### 4.4 Advertências especiais para cada espécie alvo

Não existem restrições relativamente à idade (ou peso) nas espécies animais alvo.

### 4.5 Precauções especiais de utilização

#### Precauções especiais para utilização em animais

Utilizar o medicamento veterinário em ambiente bem ventilado, evitando o contacto com os olhos do animal.

Não utilizar na zona de ordenha ou onde se possa provocar contaminação da água (tanques, azenhas, rios) dado ser tóxico para os peixes.

Lavar os úberes antes da ordenha.

Não pulverizar quando seja previsível tempo chuvoso.

### **Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais**

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do medicamento veterinário.

Lavar as mãos e a pele exposta antes de comer e após a conclusão do trabalho.

Em caso de contacto com os olhos e pele, lavar imediatamente com água.

No caso de ingestão acidental, consultar de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo. Usar luvas protetoras aquando da aplicação do medicamento veterinário ou manipulação de animais tratados recentemente.

Se vestuário ficar bastante contaminado remover e lavar antes de reutilizar.

Manter o medicamento veterinário afastado dos alimentos, bebidas e rações.

No caso de derrame, absorver o medicamento veterinário com areia e/ou serradura e lavar as superfícies contaminadas com uma solução detergente.

#### **4.6 Reações adversas (frequência e gravidade)**

Nenhuma observada.

#### **4.7 Utilização durante a gestação, a lactação e a postura de ovos**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

#### **4.8 Interações medicamentosas e outras formas de interação**

Alguns inseticidas organofosfatos podem reduzir a taxa do metabolismo e assim aumentar a toxicidade da deltametrina. Assim, evitar a utilização de inseticidas organofosfatos.

#### **4.9 Posologia e via de administração**

Aplicar o medicamento veterinário ao longo da linha média dorsal, do pescoço até à base da cauda do animal, nas seguintes dosagens:

#### **Indicações**

##### **Moscas**

#### **Dosagem**

##### **Bovinos**

< 100 kg: 10 ml

100 kg – 300 kg: 20 ml

> 300 kg: 30 ml



**Piolhos incluindo os malófagos**

**Bovinos, ovinos**

10 ml por animal independentemente do peso

**Carraças**

**Bovinos**

15 ml/100 kg (min. de 15 ml até max. de 75 ml)

#### **4.10 Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), (se necessário)**

A administração de duas vezes a dose recomendada não provoca efeitos secundários.

#### **4.11 Intervalos de segurança**

Bovinos:

Dose: até 30 ml/animal (controlo de mosca e piolhos incluindo os malófagos)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: Zero dias

Dose: 75 ml/animal (controlo da carraça)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: 12 horas

Ovinos:

Carne e vísceras: 2 dias

Leite: 12 horas

### **5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS**

Grupo farmacoterapêutico: piretróide, ectoparasitídeo para administração tópica

Código ATCvet: QP53AC11

#### **5.1 Propriedades farmacodinâmicas**

O medicamento veterinário é um ectoparasitídeo que contém como substância ativa a Deltametrina, pertencente ao grupo dos piretróides sintéticos. O seu modo de ação interfere na neurotransmissão atuando sobre os canais de sódio do parasita alvo. Após a aplicação dérmica a deltametrina é ligeiramente absorvida e fica acessível no ectoparasita alvo.

#### **5.2 Propriedades farmacocinéticas**

Após a aplicação tópica, a deltametrina é ligeiramente absorvida pela pele dos bovinos e ovinos e permanece disponível ao ectoparasita alvo. A via principal de excreção é pelas fezes.

### **6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS**

#### **6.1 Lista de excipientes**

Agente de dispersão SI



Laurilsulfato de sódio  
Silício precipitado  
Rhodorsil 416  
Rhodorsil 426R  
Goma xantana  
Ácido cítrico monohidratado  
Solução de formaldeído a 30%  
Propilenoglicol  
Água purificada

## **6.2 Incompatibilidades**

Desconhecidas.

## **6.3 Prazo de validade**

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 3 anos.  
Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 30 semanas.

## **6.4 Precauções especiais de conservação**

Proteger da luz.

## **6.5 Natureza e composição do acondicionamento primário**

Frascos doseadores de 250 ml e 1 litros de polietileno de alta densidade, fechado por duas tampas de rosca com fecho inviolável, providas internamente com selo laminado de LDPE-PVDC-LDPE e de face externa de LDPE. O aplicador encontra-se no interior do frasco.

Frasco de polietileno de alta densidade de 2,5 litros fechado com tampa provida de um selo laminado, selado termicamente, de alumínio / polietileno. O aplicador encontra-se fixo ao frasco

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

## **6.6 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos**

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Não deve ser permitida a entrada do medicamento veterinário em águas superficiais pois a deltametrina pode ter efeitos nocivos nos organismos aquáticos.

## **7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

MSD Animal Health, Lda.  
Edifício Vasco da Gama, nº 19  
Quinta da Fonte, Porto Salvo



2770-192 Paço de Arcos

**8. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

452/01/12NFVPT

**9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO**

08 de Março de 2012

**10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO**

Agosto 2016

**PROIBIÇÃO DE VENDA, FORNECIMENTO E/OU UTILIZAÇÃO**

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO****Cartonagem**  
**250 mL e 1L****1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Butox 7,5 Pour On

**2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS****Substância ativa:**

Deltametrina 7,50 mg

**Excipientes:**

Solução de formaldeído a 30%

**3. FORMA FARMACÊUTICA**

Solução para unção contínua.

**4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM**

250 ml e 1L

**5. ESPÉCIES ALVO**

Bovinos e Ovinos.

**6. INDICAÇÕES**

Para controlo de Moscas (*Haematobia irritans*, *Hippobosca equina*, *Musca domestica*) em bovinos, Piolhos em bovinos e ovinos (*Linognathus vituli*, *L. ovillus* e *Haematopinus eurystenus*), incluindo os malófagos (*Damalinia ovis* e *D. bovis*) e Carraças em bovinos (*Dermacentor marginatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Rhipicephalus bursa* e *R. sanguineus*).

Uma única aplicação assegura uma proteção eficaz nos animais durante 2 meses contra moscas e piolhos, incluindo os malófagos, e durante 2 a 5 semanas contra carraças em bovinos.

**7. MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Aplicar o medicamento veterinário ao longo da linha média dorsal, do pescoço até à base da cauda do animal, nas seguintes dosagens:


**Indicações****Dosagem**

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Moscas                         | Bovinos:<br>< 100 kg: 10 ml<br>100 kg – 300 kg: 20 ml<br>> 300 kg: 30 ml |
| Piolhos incluindo os malófagos | Bovinos, ovinos:<br>10 ml por animal independentemente do peso           |
| Carraças                       | Bovinos:<br>15 ml/100 kg (mín. de 15 ml até max. de 75 ml)               |


### Modo de emprego:



- 1) Levantar a tampa 2 da parte doseadora do frasco do medicamento veterinário. Deixar a tampa 1 permanentemente fechada.




- 2) Enroscar o aplicador no doseador.





- 3) Encher o doseador pressionando o frasco.


**IMPORTANTE:**



- 4) Segurar o frasco do lado do doseador. Colocar a parte do doseador com o aplicador para cima (ver imagem). Repartir a dose de produto ao longo da linha dorsal, desde o pescoço até à base da cauda, pressionando ligeiramente o frasco. (Repetir a aplicação no caso das moscas, em animais que têm peso superior a 100 kg e que necessitam de doses superiores a 10 ml).



- 5) Verificar se a dose ficou completamente repartida no dorso do animal; concluir a aplicação se for caso disso.



- 6) Caso se verifique a existência de medicamento veterinário no frasco após a aplicação nos animais, tirar o aplicador antes de enroscar de novo a tampa.

## **8. INTERVALO DE SEGURANÇA**

Bovinos:

Dose: até 30 ml/animal (controlo de mosca e piolhos incluindo os malófagos)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: zero dias

Dose: 75 ml/animal (controlo da carraça)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: 12 horas

Ovinos:

Carne e vísceras: 2 dias

Leite: 12 horas

## **9. ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO**

### **Precauções especiais para utilização em animais**

Utilizar o medicamento veterinário em ambiente bem ventilado, evitando o contacto com os olhos do animal.

Não utilizar na zona de ordenha ou onde se possa provocar contaminação da água (tanques, azenhas, rios) dado ser tóxico para os peixes.

Lavar os úberes antes da ordenha.

Não pulverizar quando seja previsível tempo chuvoso.

### **Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais**

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do medicamento veterinário.

Lavar as mãos e a pele exposta antes de comer e após a conclusão do trabalho.

Em caso de contacto com os olhos e pele, lavar imediatamente com água.

No caso de ingestão acidental, consultar de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo. Usar luvas protetoras aquando da aplicação do medicamento veterinário ou manipulação de animais tratados recentemente.

Se o vestuário ficar bastante contaminado remover e lavar antes de reutilizar.

Manter o medicamento veterinário afastado dos alimentos, bebidas e rações.

No caso de derrame, absorver o medicamento veterinário com areia e/ou serradura e lavar as superfícies contaminadas com uma solução detergente.

Não existem restrições relativamente à idade (ou peso) nas espécies animais alvo.

**Utilização durante a gestação, a lactação e a postura de ovos**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

**Interações medicamentosas e outras formas de interação**

Alguns inseticidas organofosfatos podem reduzir a taxa do metabolismo e assim aumentar a toxicidade da deltametrina. Assim, evitar a utilização de inseticidas organofosfatos.

**Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), (se necessário)**

A administração de duas vezes a dose recomendada não provoca efeitos secundários.

**10. PRAZO DE VALIDADE**

VAL {mês/ano}

**11. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

Proteger da luz.

**12. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO**

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Não deve ser permitida a entrada do medicamento veterinário em águas superficiais pois a deltametrina pode ter efeitos nocivos nos organismos aquáticos.

**13. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for caso disso**

**USO VETERINÁRIO**

**USO EXTERNO**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

**14. MENÇÃO “MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS”**

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

**15. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

MSD Animal Health, Lda.  
Edifício Vasco da Gama, nº 19  
Quinta da Fonte, Porto Salvo  
2770-192 Paço de Arcos



**16. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

452/01/12NFVPT

**17. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO**

Lote {número}

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO****Rótulo 250 ml, 1 L****1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Butox 7,5 Pour On

**2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS****Substância ativa:**

Deltametrina 7,50 mg

**Excipientes:**

Solução de formaldeído a 30%

**3. FORMA FARMACÊUTICA**

Solução para unção contínua.

**4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM**

250 ml, 1L

**5. ESPÉCIES ALVO**

Bovinos e Ovinos.

**6. INDICAÇÕES**

Para controlo de Moscas (*Haematobia irritans*, *Hippobosca equina*, *Musca domestica*) em bovinos, Piolhos em bovinos e ovinos (*Linognathus vituli*, *L. ovillus* e *Haematopinus eurystenus*), incluindo os malófagos (*Damalinia ovis* e *D. bovis*) e Carraças em bovinos (*Dermacentor marginatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Rhipicephalus bursa* e *R. sanguineus*).

Uma única aplicação assegura uma proteção eficaz nos animais durante 2 meses contra moscas e piolhos, incluindo os malófagos, e durante 2 a 5 semanas contra carraças em bovinos.

**7. MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Aplicar o medicamento veterinário ao longo da linha média dorsal, do pescoço até à base da cauda do animal.

**8. INTERVALO DE SEGURANÇA**

Bovinos:

Dose: até 30 ml/animal (controlo de mosca e piolhos incluindo os malófagos)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: zero dias

Dose: 75 ml/animal (controlo da carraça)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: 12 horas

Ovinos:

Carne e vísceras: 2 dias

Leite: 12 horas

#### **9. ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO**

Antes de utilizar, leia a cartonagem.

#### **10. CONTRA INDICAÇÕES**

Não existem.

#### **11. REAÇÕES ADVERSAS**

Nenhuma observada.

#### **12. PRAZO DE VALIDADE**

VAL

#### **13. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

Proteger da luz.

#### **14. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS RESÍDUOS, SE FOR CASO DISSO**

O medicamento não utilizado ou os seus resíduos devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Não deve ser permitida a entrada do medicamento veterinário em águas superficiais pois a deltametrina pode ter efeitos nocivos nos organismos aquáticos.

#### **15. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for caso disso**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.



USO EXTERNO

USO VETERINÁRIO

**16. MENÇÃO “MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS”**

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

**17. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

MSD Animal Health, Lda.  
Edifício Vasco da Gama, nº 19  
Quinta da Fonte, Porto Salvo  
2770-192 Paço de Arcos

**18. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

452/01/12NFVPT

**19. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO**

Lote

**20. FABRICANTE**

Intervet Productions, SA  
Rue de Lyons  
27460 Igoville  
França

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO****Rótulo 2,5L****1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Butox 7,5 Pour On

**2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS****Substância ativa:**

Deltametrina 7,50 mg

**Excipientes:**

Solução de formaldeído a 30%

**3. FORMA FARMACÊUTICA**

Solução para unção contínua.

**4. DIMENSÃO DA EMBALAGEM**

2,5 L

Dispositivo doseador incluindo.

**5. ESPÉCIES-ALVO**

Bovinos e ovinos.

**6. INDICAÇÕES**

Para controlo de Moscas (*Haematobia irritans*, *Hippobosca equina*, *Musca domestica*) em bovinos, Piolhos em bovinos e ovinos (*Linognathus vituli*, *L. ovillus* e *Haematopinus eurystenus*), incluindo os malófagos (*Damalinia ovis* e *D. bovis*) e Carraças em bovinos (*Dermacentor marginatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Rhipicephalus bursa* e *R. sanguineus*).

Uma única aplicação assegura uma proteção eficaz nos animais durante 2 meses contra moscas e piolhos, incluindo os malófagos, e durante 2 a 5 semanas contra carraças em bovinos.

**7. MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Aplicar o medicamento veterinário ao longo da linha média dorsal, do pescoço até à base da cauda do animal.



| Indicações                     | Dosagem                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Moscas                         | Bovinos:<br>< 100 kg: 10 ml<br>100 kg – 300 kg: 20 ml<br>> 300 kg: 30 ml |
| Piolhos incluindo os malófagos | Bovinos, ovinos:<br>10 ml por animal independentemente do peso           |
| Carraças                       | Bovinos:<br>15 ml/100 kg (min. de 15 ml até max. de 75 ml)               |

## 8. INTERVALO DE SEGURANÇA

Bovinos:

Dose: até 30 ml/animal (controlo de mosca e piolhos incluindo os malófagos)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: zero dias

Dose: 75 ml/animal (controlo da carraça)

Carne e vísceras: 18 dias

Leite: 12 horas

Ovinos:

Carne e vísceras: 2 dias

Leite: 12 horas

## 9. ADVERTÊNCIA ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO

### Precauções especiais para utilização em animais

Utilizar o medicamento veterinário em ambiente bem ventilado, evitando o contacto com os olhos do animal.

Não utilizar na zona de ordenha ou onde se possa provocar contaminação da água (tanques, azenhas, rios) dado ser tóxico para os peixes.

Lavar os úberes antes da ordenha.

Não pulverizar quando seja previsível tempo chuvoso.

### Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do medicamento veterinário.

Lavar as mãos e a pele exposta antes de comer e após a conclusão do trabalho.

Em caso de contacto com os olhos e pele, lavar imediatamente com água.

No caso de ingestão acidental, consultar de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo. Usar luvas protetoras aquando da aplicação do medicamento veterinário ou manipulação de animais tratados recentemente.

Se o vestuário ficar bastante contaminado remover e lavar antes de reutilizar.

Manter o medicamento veterinário afastado dos alimentos, bebidas e rações.

No caso de derrame, absorver o medicamento veterinário com areia e/ou serradura e lavar as superfícies contaminadas com uma solução detergente.

Não existem restrições relativamente à idade (ou peso) nas espécies animais alvo.

**Utilização durante a gestação, a lactação e a postura de ovos**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

**Interações medicamentosas e outras formas de interação**

Alguns inseticidas organofosfatos podem reduzir a taxa do metabolismo e assim aumentar a toxicidade da deltametrina. Assim, evitar a utilização de inseticidas organofosfatos.

**Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), (se necessário)**

A administração de duas vezes a dose recomendada não provoca efeitos secundários

**10. CONTRAINDICAÇÕES**

Não existem.

**11. REAÇÕES ADVERSAS**

Nenhuma observada.

**12. PRAZO DE VALIDADE**

VAL

**13. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

Proteger da luz.

**14. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO**

O medicamento não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Não deve ser permitida a entrada do medicamento veterinário em águas superficiais pois a deltametrina pode ter efeitos nocivos nos organismos aquáticos.

**15. MENÇÃO “EXCLUSIVAMENTE PARA USO VETERINÁRIO” E CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E À UTILIZAÇÃO, se for caso disso**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

**USO EXTERNO**

**USO VETERINÁRIO**

**16. MENÇÃO “MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS”**



Manter fora do alcance e da vista das crianças.

**17. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

MSD Animal Health, Lda.  
Edifício Vasco da Gama, nº 19  
Quinta da Fonte, Porto Salvo  
2770-192 Paço de Arcos

**18. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

452/01/12NFVPT

**19. NÚMERO DO LOTE DE FABRICO**

Lote {número}

**20. FABRICANTE**

Intervet Productions, SA  
Rue de Lyons  
27460 Igoville  
França