

Gebrauchsinformation

Vetofer,

100 mg/ml Injektionslösung für *Schweine (Ferkel), Rinder (Kälber), Hunde, Nerze*

Wirkstoff: Eisen(III)-Ionen (als Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex)

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Straße 19

D-49377 Vechta

Im Falle des Mitvertriebs zusätzlich:

Selectavet Dr.Otto Fischer

Am Koegelberg 5

D-83629 Weyarn

Bezeichnung des Tierarzneimittels:

Vetofer,

100 mg/ml Injektionslösung für *Schweine (Ferkel), Rinder (Kälber), Hunde, Nerze*

Wirkstoff: Eisen(III)-Ionen (als Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex)

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff(e):

Eisen(III)-Ionen 100 mg

(als Eisen(III)-hydroxid-Dextran-Komplex)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckmäßige Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Natriummethyl-4-hydroxybenzoat 1,05 mg

Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat 0,16 mg

Natriumedetat 5,00 mg

Anwendungsgebiet(e):

Ferkel, Kalb, Hund, Nerz:

Zur Therapie von Eisenmangelzuständen und Anämien verschiedener Genese:
nach Infektionskrankheiten, Blutverlust, Parasitenbefall, Aufzuchtmängeln und
Fressunlust.

Zur Prophylaxe von Eisenmangelanämien bei Saugferkeln.

Gegenanzeigen:

Nicht bei Tieren einsetzen, die an einer Infektion erkrankt sind, insbesondere nicht bei Durchfallerkrankungen.

Nebenwirkungen:

Bei Vitamin E- bzw. Selenmangel neugeborener Ferkel kann Eisendextran anaphylaktische Reaktionen mit Todesfällen hervorrufen.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder

Apotheker mit.

Zieltierart(en):

Ferkel, Kalb, Hund, Nerz

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Zur intramuskulären oder subcutanen Anwendung beim *Ferkel* und *Kalb*.

Zur intramuskulären Anwendung bei *Hund* und *Nerz*.

Ferkel:	100 mg Fe ³⁺ / kg Körpergewicht entsprechend 1 ml Vetofer pro kg Körpergewicht Zur Prophylaxe einmalig zwischen 1. und 3. Lebenstag Bei Ferkeln wird eine weitere Injektion in der 3. Lebenswoche empfohlen.
Kälber:	10-30 mg Fe ³⁺ / kg Körpergewicht entsprechend 0,1-0,3 ml Vetofer pro kg Körpergewicht
Hunde:	1-2 mg Fe ³⁺ / kg Körpergewicht entsprechend 0,1-0,2 ml Vetofer pro 10 kg Körpergewicht
Nerze:	50 mg Fe ³⁺ / kg Körpergewicht entsprechend 0,5 ml Vetofer pro kg Körpergewicht

Zur einmaligen Anwendung. Falls erforderlich kann nach 8 bis 10 Tagen eine Wiederholung der Behandlung erfolgen.

Nicht mehr als 10 ml Vetofer pro Injektionsstelle verabreichen.

Hinweise für die richtige Anwendung:

Siehe oben (Art der Anwendung)

Wartezeit(en):

Ferkel, Kälber:

essbare Gewebe: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungshinweise notwendig.

Haltbarkeit nach Anbruch: 14 Tage.

Im Behältnis verbleibende Restmengen des Arzneimittels sind nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Besondere Warnhinweise:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Nicht mehr als 10 ml Vetofer pro Injektionsstelle verabreichen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Der direkte Kontakt des Arzneimittels mit der Haut und den Schleimhäuten des Anwenders ist zu vermeiden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel) falls erforderlich:

Bei Überdosierungen können gastrointestinale Störungen sowie Herz- und

Kreislaufversagen auftreten.

Inkompatibilitäten:

Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen der Gefahr möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Tierarzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:

12.12.2018

Weitere Angaben:

OP (1 x 100 ml)

OP (5 x 100 ml)

OP (6 x 100 ml)

OP (10 x 100 ml)

OP (12 x 100 ml)

BP 5 x (1 x 100 ml)

BP 6 x (1 x 100 ml)

BP 10 x (1 x 100 ml)

BP 12 x (1 x 100 ml)

BP 8 x (6 x 100 ml)

BP 4 x (12 x 100 ml)

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.