

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rapidexon 2 mg/ml Injektionslösung

[Darreichungsform-Piktogramm]

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

25 ml

50 ml

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: Intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre, intrabursale oder lokale Anwendung.

Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind Essbare Gewebe: 8 Tage

Milch: 72 Stunden

Schwein Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem Anbrechen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

[Firmenlogo]

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V315533

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rapidexon 2 mg/ml Injektionslösung

[Darreichungsform-Piktogramm]


2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: Intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre, intrabursale oder lokale Anwendung.

Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: Intramuskuläre Anwendung.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind Essbare Gewebe: 8 Tage
 Milch: 72 Stunden

Schwein Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis ...

Nach Anbrechen verwendbar bis...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS


[Firmenlogo]

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**25 / 50 ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rapidexon

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

2,0 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

[Firmenlogo]