

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Umkarton der 1 Liter HDPE-Flasche
/Etikett**

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

KetoProPig 100 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine
Wirkstoff Ketoprofen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Ketoprofen 100 mg
Benzylalkohol (E1519): 20 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Eingeben.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Liter

5. ZIELTIERART(EN)

Schwein (Mastschwein)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Symptomatische Behandlung von Mastschweinen zur Fiebersenkung bei akuten infektiösen
respiratorischen Erkrankungen in Kombination mit einer geeigneten antibiotischen Therapie.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Lösung zum Eingeben nach Verdünnung über das Trinkwasser. Eine Verabreichung über
einen Zeitraum von 24 Stunden wird empfohlen.

Die empfohlene Tagesdosis ist 3 mg Ketoprofen/kg Körpergewicht, dies entspricht 0,03 ml
KetoProPig 100 mg/ml Lösung zum Eingeben / kg Körpergewicht.

Dauer der Behandlung: 1 Tag. Nach Abschätzung des Nutzen-Risikoverhältnisses durch den
Tierarzt kann eine weitere Behandlung für maximal 1-2 Tage in Betracht gezogen werden.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 2 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

- Bei Herstellung der gebrauchsfertigen Tierarzneimittellösung Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Bei versehentlichen Spritzern auf die Haut die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
- Bei versehentlichem Augenkontakt die Augen sofort gründlich mit klarem Leitungswasser spülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.
- Kontaminierte Kleidung ablegen, und Spritzer auf die Haut sofort abwaschen. Nach der Anwendung Hände waschen.
- Es können Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautrötung, Urtikaria) auftreten. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff sollten den Umgang mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 4 Monate

Dauer der Haltbarkeit nach Verdünnung: 24 Stunden

Nach dem Anbrechen / Öffnen verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITELS, SOFERN ERFORDERLICH

Für Tiere - Verschreibungs- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Labiana Life Sciences, S.A.U.
Venus 26 - Can Parellada
E-08228 Terrasa - Barcelona
Spanien

Vertreiber:
Huvepharma NV
Uitbreidingsstraat 80,
2600 Antwerp, Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Z.Nr.: 8-00768

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}