

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

INDIGEST 100 mg/ml injekční roztok Menbutonum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Laboratorios Calier S.A.,
Barcelonès, 26 (Pla del ramassà)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Španělsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INDIGEST 100 mg/ml injekční roztok
Menbutonum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Menbutonum 100 mg

Pomocné látky:

Chlorokresol 2 mg

Čirý až nažloutlý injekční roztok

4. INDIKACE

Žaludeční, duodenální a biliární dysfunkce, stimulace sekrece digestivních žláz.
Skot: indigesce, toxemie, ketoza, anorexie, jaterní a pankreatická nedostatečnost.
Ovce a kozy: indigesce, toxémie (vč. porodní), intoxikace, jaterní a pankreatická nedostatečnost
Prasata: indigesce, anorexie, intoxikace, jaterní a pankreatická nedostatečnost
Koně: toxemie, anorexie, koliky, jaterní a pankreatická nedostatečnost
Psi: indigesce, toxemie, anorexie, obstrukce, jaterní a pankreatická nedostatečnost

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávat u zvířat se srdeční nedostatečností, hypertermií nebo obstrukcí žlučového měchýře.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po příliš rychlém intravenózním podání se může objevit třes, zrychlené dýchání, spontánní defekace, kašel, slzení, výtok z nosu a kolaps zvířete.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, kozy, prasata, koně, psi

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární nebo intravenózní podání

Skot: 20-40 ml /ks a den, hluboko i.m. nebo pomalu i.v.

Telata: 5-15 ml /ks a den, hluboko i.m., nebo pomalu i.v.

Ovce a kozy: 5-10 ml/ks a den hluboko i.m. nebo pomalu i.v.

Prasata: 5-10 ml /ks a den hluboko i.m. nebo pomalu i.v.

Koně: 20-30 ml /ks a den pomalu i.v.

Psi: 0,1 ml /kg ž.hm.hluboko i.m, nebo pomalu i.v.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podání je možno opakovat po 24 hodinách na základě posouzení veterinárního lékaře.

Max. množství přípravku na jedno místo injekčního podání je 20 ml.

Intravenózní podání musí být provedeno velmi pomalu (déle než jednu minutu) přípravkem zahřátým na tělesnou teplotu.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 2 dny

Mléko: 2 dny

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte lahvičku v krabici, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Hraniční dávka membutonu není známa, proto musí být přesně dodržováno dávkování. V případě zástavy srdce je třeba aplikovat kardiotonika.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě zasažení pokožky nebo očí přípravkem, omývejte postižené místo několik minut proudem čisté vody. Lidé se známou přecitlivělostí k menbutonu nebo kterékoli pomocné látce by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Březost:

Nepodávat zvířatům v poslední třetině březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat souběžně s roztoky obsahujícími vápník, prokain penicilin, vitamin B komplex.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poradte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2021

15. DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.

Velikost balení:

Krabička s lahvičkou obsahující 100 ml roztoku.