

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ЕКТОМИН
ЕСТОМИН
Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Cypermethrin 10 g/100 ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце и кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на инвазии с паразити, чувствителни към циперметрин - лечение на инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи, както и за лечение на краста.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Овце:
Месо и вътрешни органи – 7 дни.
Говеда:
Месо и вътрешни органи – 28 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чистото мляко е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвай в рамките на 30 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.
Да се съхранява далече от източници на топлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”
--

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-3032

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклен флакон от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ЕКТОМИН

ЕСТОМИН

Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Cypermethrin 10 g/100 ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце и кучета.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Овце:

Месо и вътрешни органи – 7 дни.

Говеда:

Месо и вътрешни органи – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 30 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява далече от източници на топлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Стъклен флакон от 5 ml, 10 ml, 20 ml и 50 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ЕКТОМИН

ЕСТОМИН

Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Cypermethrin 10 g/100 ml

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot{номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 30 дни.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ

ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

ЕКТОМИН

ECTOMIN

Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета

2. Състав

В 100 ml се съдържат:

Активно вещество:

Cypermethrin 10 g

Помощни вещества:

Polysorbate 80

Macrogol 400

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, овце и кучета.

4. Показания за употреба

Лечение на инвазии с паразити, чувствителни към циперметрин - лечение на инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи, както и за лечение на краста.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ КОТКИ. Този продукт е изключително токсичен за котки и може да доведе до тяхната смърт. За да се предпазят котките от инцидентно излагане на действието на продукта е необходимо третираните кучета да се държат отделно от котките за период от 72 часа след третирането.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Да не се използва в комбинация с други противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен само за прилагане върху кожата, при стриктно спазване на всички указания за употреба.

Трябва да се внимава, при прилагане, продуктът да не попада в очите на животните.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Използвайте продукта на добре проветриво място и избягвайте вдишването на парите.

Да се избягва директен контакт с кожата. Да се измият ръцете след употреба. При контакт ръцете да се измият обилно с вода.

Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, незабавно да се изплакнат, обилно с вода.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни очила, маска за лице за еднократна употреба, защитно облекло, гумени ръкавици и ботуши, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да не се пипа мястото на приложение за период от 3-6 часа след третирането.

Веднага след работа с продукта свалете замърсените дрехи и измийте откритата кожа с чиста вода. Хора с установена свръхчувствителност към пиретроидните инсектициди трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

При случайно поглъщане или при продължително кожно или очно дразнещо действие, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикетата на продукта. При работа с продукта да не се яде, пие или пуши.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да попада във водни басейни, тъй като циперметринът е опасен за риби и други водни организми. Затова е важно да се гарантира, че животните се третират в зона, където след изкърпване течността може да се оттича във вана. Необходимо е да се гарантира, че животните не влизат или пресичат водни течения, докато космената покривка е още мокра. Да не се къпят животни в близост до водни корита.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се използва в комбинация с други противопаразитни продукти.

Предозиране:

Циперметринът е слабо токсичен при приложение върху кожата. Признаците на интоксикация при всички пътища на приемане са характерни за циано-индуцираните пиретроидни интоксикации и се характеризират със седация, атаксия, приведена походка, непостоянен тремор и конвулсии. Тези признаци на токсичност се появяват няколко часа след прилагане на дозата и се проявяват при оцелелите за период от 3 дни.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

7. Неблагоприятни реакции

Не са известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За прилагане върху кожата.

	Степен разтваряне с вода	на	Концентрация, която трябва да се приложи	Забележки
Говеда	1 : 1000		100 ppm	Напръскване на цялото тяло; изкърпване
Говеда	1 : 200		500 ppm	Напръскване по гръбнака на животното (от тила до основата на опашката) 0.5 L/животно

Овце	1 : 1000	100 ppm	Изкърпване
Кучета	1 ml/L	100 ppm	Напръскване на цялото тяло

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Моля, вижте т.8.

10. Карентни срокове

Овце:

Месо и вътрешни органи – 7 дни.

Говеда:

Месо и вътрешни органи – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява далече от източници на топлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 30 дни

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като циперметрин може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Не трябва да се замърсяват езера, водни пътища или канавки с продукта или празни опаковки.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-3032

Стъклен флакон с гумена тапа и алуминиева капачка от 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml и 100 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

03/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул.”Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР