

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Depomycin suspenzija za injiciranje za govedo, prašiče, ovce, pse in mačke

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml suspenzije za injiciranje vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

prokainijev benzilpenicilat	200,0 mg
dihidrostreptomicinijev sulfat	278,9 mg
(ekvivalentno: dihidrostreptomicin	200,0 mg)

Pomožne snovi:

metilparahidroksibenzoat	0,8 mg
--------------------------	--------

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo, prašiči, ovce, psi in mačke

6. INDIKACIJE

7. NAČIN IN POTI UPORABE

Govedo, prašiči, ovce: intramuskularna pot.
Psi, mačke: intramuskularna in subkutana pot.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 60 dni
V primeru, da se zavrže organe in mesta injiciranja, je karenca 14 dni.

Mleko (krav): 3 dni (6 molž)

Ni dovoljena uporaba pri ovcah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNA OPOZORILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: <mm/llll>

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

Wim de Körverstr. 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0084/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot. <številk>

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI
Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Depomycin suspenzija za injiciranje za govedo, prašiče, ovce, pse in mačke

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml suspenzije za injiciranje vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

prokainijev benzilpenicilat	200,0 mg
dihidroestreptomicinijev sulfat	278,9 mg
(ekvivalentno: dihidroestreptomicin	200,0 mg)

Pomožne snovi:

metilparahidroksibenzoat	0,8 mg
--------------------------	--------

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo, prašiči, ovce, psi, mačke

6. INDIKACIJE

7. NAČIN IN POTI UPORABE

Govedo, prašiči, ovce: i.m.

Psi, mačke: i.m., s.c.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 60 dni

V primeru, da se zavrže organe in mesta injiciranja, je karenca 14 dni.

Mleko (krav): 3 dni (6 molž)

Ni dovoljena uporaba pri ovcah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNA OPOZORILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: <mm/llll>

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

12. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. RP-vet

13. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

14. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Intervet International B.V.
Wim de Körverstr. 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemska

15. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0084/001

16. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE
--

Lot. <števila>