

ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos met spuiten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL****ORBENIN Long Acting**, 200 mg, suspensie voor intramammaire gebruik**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)***Cloxacillin. natricum monohydricum* (= *Cloxacillin*. 200 mg/3g)**3. VERPAKKINGSGROOTTE****3, 12 of 48** Injectoren voor intramammair gebruik**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Runderen (lacterende melkkoeien).

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Met de Orbenin Long Acting injector kan men het diergeneesmiddel toedienen met een korte of een lange canule. Dien bij voorkeur toe met een korte canule.

Gebruiksaanwijzing voor de korte canule:

Breek het bovenste deel van de beschermkap af. Breng enkel de korte canule in het tepelkanaal en druk langzaam de injector leeg. Raak in geen geval de canule met de vingers aan.

Gebruiksaanwijzing voor de lange canule:

Verwijder de beschermkap door deze aan de basis lichtjes om te buigen tot ze loskomt. Breng de canule voorzichtig in het tepelkanaal en druk de injector langzaam leeg. Raak in geen geval de canule met de vingers aan.

Dessin explicitant l'utilisation de la seringue avec embout court ou avec embout long.

7. WACHTTIJD(EN)**Wachttijd:**

Melk: 120 uren na de laatste toediening

Vlees en slachtafval: 1 dag

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V080437

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Sputen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL****ORBENIN Long Acting**, 200 mg, suspensie voor intramammaire gebruik voor runderen**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN***Cloxacillin. natricum monohydricum* (= *Cloxacillin*. 200 mg/3g)**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}