

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/03/01579**

**Supprestral injectable**  
50 mg/ml suspensija injekcijām suņiem un kaķiem  
*Medroxyprogesterone acetate*

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

VETOQUINOL S.A.  
Magny-Vernois  
F - 70200 LURE  
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

VETOQUINOL S.A.	Vetoquinol Biowet Sp z o.o.,
Magny-Vernois	13-14 Kosynierow Gdyskich st.,
F - 70200 LURE	66-400 Gorzów Wlkp.,
Francija	Polija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Supprestral injectable**  
50 mg/ml suspensija injekcijām suņiem un kaķiem  
*Medroxyprogesterone acetate*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS**

**Aktīvā viela:** Medroksiprogesterona acetāts

**Papildvielas:** Metilparabēns, propilparabēns, nātrija hlorīds, polisorbāts 80, polietilēnglikols 4000, nātrija acetāts, etiķskābe, ūdens injekcijām.

**4. INDIKĀCIJAS**

Meklēšanās novēršanai un pārtraukšanai kucēm un kaķenēm. Supprestral injectable ilgstošā darbība kavē meklēšanos ilgu laika periodu. Tādējādi iespējams novērst pārošanos, nevēlamu grūsnību un neērtības, kuras rada meklēšanās (asiņošana, seksuālā uzvedība). Meklēšanās novēršana attiecināma uz kavējošo ārstēšanu ārpus meklēšanās perioda. Pārtraukšana tiek veikta, ja ārstēšanu veic meklēšanās laikā.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Pirms progesteronu lietošanas nepieciešams veikt rūpīgu klīnisko izmeklēšanu.

Kontrindikācijas ir:

- grūsnība;
- novēlota iejaukšanās;
- ārstēšana, kas veikta vēlāk pēc proestrus sākuma var būt neefektīva un var palielināt komplikāciju risku;

- ārstēšana, kas veikta dažas dienas pirms vai pēc pārošanās bieži var izraisīt apgrūtinātas dzemdības (dzemdes atonija, nedzīvi piedzimuši kucēni vai kaķēni);
- ģenitālās sistēmas traucējumi;
- dzimumorgānu disfunkcijas, dzemdes infekcijas, olnīcu un piena dziedzeru audzēji, citi reproduktīvās sistēmas traucējumi;
- nesena ķirurģiska iejaukšanās ģenitālajā traktā;
- diabēts.

## 6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

- Īslaicīgs svara pieaugums.
- Palielināts dzemdes tilpums.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Intramuskulārām vai subkutānām injekcijām.

Ja tiek veikta subkutāna injekcija, tad jāizvēlas neredzams ādas apvidus (priekšējā ciskas kroka, kājas iekšpuse) iespējamās lokālās reakcijas dēļ (īslaicīga ādas un apmatojuma depigmentācija).

Pirms lietošanas flakonu rūpīgi saskalināt līdz izveidojas homogēna suspensija.

Kucēm: atkarībā no dzīvnieka lieluma 0,5 - 2 ml.

Punduršķirņu un milzīga auguma šķirņu kucēm deva jākorrigē tā, lai novērstu negatīvās progestagēnu darbības sekas. (H.S. Braiens ir rekomendējis, ka nedrīkst pārsniegt vispārīgo devu 50 mg uz 10 kg ķermeņa svara).

Kaķenēm: atkarībā no dzīvnieka lieluma 0,5 – 1 ml.

Siāmas šķirnes kaķenēm devu nosaka individuāli, jo dažos gadījumos dzimumaktivitāte faktiski var turpināties.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Neievadīt intravenozi. Pirms lietošanas labi saskalināt. Sargāt no gaismas.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Sargāt no gaismas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Kurtu kucēm: Supprestral var izraisīt piena dziedzeru sastrēgumu un galaktoreju; šādos un ar līdzīgiem simptomiem gadījumos produktu lietot uzmanīgi.

Dzimumnenobriedušām kucēm: ārstēšana var tikt veikta, bet ieteicams atļaut norītēt pirmajam meklēšanās periodam, lai noteiktu iespējamās reproduktīvās patoloģijas.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

22/09/2008

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.