

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rheumoxidyl 20 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält
Meloxicam 20 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein und Pferd

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG****Rind:**

Zur einmaligen subkutanen oder intravenösen Anwendung.

Schwein:

Zur einmaligen intramuskulären Anwendung. Bei Bedarf kann nach 24 Stunden eine zweite Gabe erfolgen.

Pferd:

Zur einmaligen intravenösen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder: Essbare Gewebe: 15 Tage; Milch: 120 Stunden

Schweine: Essbare Gewebe: 5 Tage

Pferde: Essbare Gewebe: 5 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

C&H Generics Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V661413

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche (50 ml, 100 ml, 250 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rheumoxidyl 20 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Meloxicam 20 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein und Pferd

4. ARTEN DER ANWENDUNG**Rind:**

Zur einmaligen s.c. oder i.v. Anwendung.

Schwein:

Zur einmaligen i.m. Anwendung. Bei Bedarf kann nach 24 Stunden eine zweite Gabe erfolgen.

Pferd:

Zur einmaligen i.v. Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder: Essbare Gewebe: 15 Tage; Milch: 120 Stunden**Schweine:** Essbare Gewebe: 5 Tage**Pferde:** Essbare Gewebe: 5 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

C&H Generics Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche (20 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rheumoxidyl 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält:

Meloxicam 20 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____